

# **The Efficacy of Pre-Mixed Herbicides of Fenoxaprop-p-ethyl + Metribuzin (21.37% EC) in Compared to Common Herbicides for Weed Control of Wheat (*Triticum aestivum*) in Fars Province (Darab)**

**Ebrahim Mamnoie<sup>1</sup>, Mohammad Reza Karaminejad<sup>2</sup>, Mehdi Minbashi Moeini<sup>2</sup>**

**1-Assistant Professor of Plant Protection Research Department, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Fars, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Darab, Iran**  
**2, 3-Research Associate and Associate Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran, respectively**

**Introduction:** Wheat (*Triticum aestivum*) is one of the most important crops in Iran. The area under cultivation of this crop in Fars's province is 421,000 hectares. Weeds are one of the most significant factors limiting crop production. They primarily decrease grain yield by competing with the crop for light, nutrients, water, and root space. Weeds can cause a significant reduction in wheat yield, with an average by 23-35%. The most important weed species of wheat in Fars are including *Lolium rigidum* L., *Bromus tectorum* L., *Mavla neglecta* Wallr., *Hirschfeldia incana* L., *Carthamus oxyacanthus* M.B., *Centaurea solstitialis* L., *Veronica persica* L. The rigid ryegrass (*Lolium rigidum*) is one of the most troublesome weeds in winter wheat fields of Fars province. This weed, *Lolium rigidum*, has the capacity to produce 45,000 seeds m<sup>-2</sup> in infested wheat fields. Its highly competitive nature for nutrients has been reported to cause a significant reduction in wheat yield. The application of herbicides is the most common method of weed control in wheat fields. Herbicides are registered for weed control in winter wheat fields included of Axial®, Topik®, Othello®, Atlantis®, Total®, Bromicide® MA, Geranestar® and Apiros®. There are a limited number of herbicides that is used in wheat. Therefore, it is necessary to register new herbicides in winter wheat. The objectives of this research were to optimize the dosage of FenoMetri in combination with a non-ionic surfactant, Tifis®, and to compare its efficacy with other pre-mixed herbicides (Bromicide® MA, Othello®, and Atlantis®).

**Materials and Methods:** In order to study the efficacy of herbicides in controlling weeds in wheat fields, an experiment was conducted at the Fars Province Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Darab, Iran, during 2021-2022. This experiment was carried out using a randomized complete block design with 14 treatments and 4 replications. The treatments included post emergence

application of Bromicide MA® at 1.5 L ha<sup>-1</sup> + Topik® at 1 L ha<sup>-1</sup>, Bromicide MA® at 1.5 L ha<sup>-1</sup> +Puma-super® at 1 L ha<sup>-1</sup>, Granstar® at 20 g ha<sup>-1</sup>+Topik® at 1 L ha<sup>-1</sup>, Atlantis® at 1.5 L ha<sup>-1</sup>, Othello® at 1.6 L ha<sup>-1</sup>, Tifis® at 300 g ha<sup>-1</sup>, FenoMetri at 0.8, 1 and 1.2 L ha<sup>-1</sup> with and without surfactant at 1 L ha<sup>-1</sup>, Sencor® 800 g ha<sup>-1</sup> (400 g ha<sup>-1</sup> in the 1- 3 leaf stage + 400 g ha<sup>-1</sup> in the tillering stage of wheat and Control (hand weeding). Each plot was divided into two subplots. One subplot was treated with the herbicide applications, while the other subplot was left unsprayed to consider as a weedy check treatment for comparison purposes. Herbicide treatments were applied in tillering stage of wheat (Zadoks' scale = 25) using a pressure backpack sprayer equipped with an 8002 flat fan nozzle tip, which delivered 350 L ha<sup>-1</sup> at 2 bar spray pressure. Traits were recorded including weed density, weed biomass, plant height, grains per spike, number spikes, 1000 grains weigh, grain yield and biological yield. Weed density and dry weight were determined in random 0.50-m<sup>2</sup> quadrates per plot. The grain yield and biological yield were recorded for a 3 m<sup>2</sup> and 0.50 m<sup>2</sup> from each plot, respectively. Weed control efficiency (WCE) representing the degree of reduction in the density or dry biomass of weeds due to herbicide treatment was determined using Equation 1.

$$WCE (\%) = \frac{(A - B)}{A} \times 100, \quad (1)$$

where, A and B are the density or dry biomass of weeds in the unsprayed and sprayed subplots, respectively (Somani, 1992). The changes in each trait of yield wheat ( $Y_i$ ), as mentioned above, were determined using Equation 2

$$Y_i (\%) = \frac{Y_s}{Y_u} \times 100, \quad (2)$$

where  $Y_s$  and  $Y_u$  are the amount of each trait in the sprayed and unsprayed subplots (weedy check treatment), respectively. After checking data normality, the data were subjected to analysis of variance using SAS 9.2 software. To compare the means, the Fisher's Least Significant Difference (LSD) test was used at the 5% level of significance.

**Results and Discussion:** Weeds infestations included *Lolium rigidum* L., *Convolvulus arvensis* L., *Melilotus officinalis* (L.) Lam and *Carthamus oxyacanthus* M.B. The highest and lowest density were observed for *L. rigidum* (56%) and *C. oxyacanthus* (5.1%), respectively. While, the highest and lowest weight were observed for *L. rigidum* (74%) and *C. oxyacanthus* (4%), respectively. The statistical analysis of the data on the weed density and biomass were revealed that applied herbicides significantly decreased both weed density and biomass. Additionally, the herbicide treatments led to a significant increase in the number of spikes per m<sup>2</sup>, grains per spike, 1000 grains weight, grain yield, and biological

yield. The Bromicide MA® had the best treatment for controlling the broad-leaved weed by 80 – 85%, On the other hand, Sencor had the best control for ryegrass (*L. rigidum*) by 80%. The application of FenoMetri at 1.2 L ha<sup>-1</sup> with Surfactant® decreased the biomass of *C. arvensis*, *C. oxyacanthus*, *M. officinalis*, *L. rigidum* and total weed by 71, 63, 52, 48 and 73% respectively. It also increased grain and biological yields up to 20% and 22% as compared to the weedy check treatment. Additionally, the herbicides of Sencor® and Othello® showed the highest- grain yield after hand weeding, respectively.

**Conclusion:** The application of FenoMetri at 1.2 L ha<sup>-1</sup> with Surfactant effectively controlled the density of weed species by 45–71% and the dry biomass of weed species by 48–72%. It also increased grain and biological yields by up to 20% and 22%, respectively, compared to the weedy check treatment. However, the efficacy of FenoMetri herbicide in controlling weeds was lower compared to commonly used herbicides such as Othello®, Bromicide MA® + Topik®, and Bromicide MA® + Puma super®. Therefore, it is recommended to evaluate the FenoMetri herbicide with higher application rates.

**Keyword:** Chemical Control, Surfactant, Density, Dry Weight, *Lolium rigidum*

## کارایی علفکش پیش مخلوط فنوکسایپروپ پی‌اتیل + متربوزین (EC 21.37%) در مقایسه با علفکش‌های رایج در کنترل علفهای هرز گندم (*Triticum aestivum*) در استان فارس (داراب)

ابراهیم ممنوعی<sup>\*</sup>، محمد رضا کرمی نژاد<sup>۲</sup>، مهدی مین باش معینی<sup>۳</sup>

۱- استادیار پژوهش پخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج

کشاورزی، داراب، ایران (نوسنده مسئول) [e.mamnoie@areeo.ac.ir](mailto:e.mamnoie@areeo.ac.ir)

آدرس: استان فارس، داراب، ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، ایران.

۲و ۳- به ترتیب مری و داتشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور سازما تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تهران، ایران

### چکیده

به منظور ارزیابی کارایی علفکش‌های پیش مخلوط فنوکسایپروپ پی‌اتیل + متربوزین در کنترل علفهای هرز مزارع گندم داراب (استان فارس)، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل برومکسینیل اکتانوآت+امسی‌پی‌آ اتیل هگزیل استر (برومایسید آم، ۴۰ درصد EC) + کلودینافوب پروپارژیل (تاپیک، ۸ درصد EC) به ترتیب به مقدار ۱/۵ + ۱ لیتر در هکتار، تری‌بنورون متیل (گرانستار، ۷۵ درصد DF)+تاپیک به ترتیب به مقدار ۲۰ گرم + ۱ لیتر در هکتار، برومایسید آم + فنوکسایپروپ پی‌اتیل (پوماسوپر، ۷/۵ درصد EW) به ترتیب به مقدار ۱/۵ لیتر در هکتار، مزوسلوفورون متیل + یدوسولفورون متیل سدیم + مفن‌پایر (آتلانتیس، ۱۲ درصد OD) به مقدار ۱/۵ لیتر در هکتار، مزوسلوفورون متیل + یدوسولفورون متیل سدیم + دیفلوفنیکان + مفن‌پایر (أتللو، ۶ درصد OD) به مقدار ۱/۶ لیتر در هکتار، مزوسلوفورون + یدوسولفورون متیل سدیم (تیفیس، ۳۶ درصد WG) به مقدار ۳۰۰ گرم در هکتار، متربوزین (سنکور، ۷۰ درصد WP) به مقدار ۸۰۰ گرم در هکتار، فنوکسایپروپ پی‌اتیل + متربوزین (به اختصار فنومتری، ۲۱/۳۷ درصد EC) به مقدار ۱/۸ و ۱/۲ لیتر در هکتار با و بدون ماده افزودنی و شاهد وجین دستی بودند. نتایج نشان داد با افزایش مقادیر کاربرد علفکش فنومتری توأم با ماده افزودنی، کارایی کنترل علفهای هرز افزایش یافت. به طوری که علفکش فنومتری (۱/۲ لیتر در هکتار)+مواد افزودنی سبب کاهش معنی‌دار وزن خشک پیچک (*Lolium rigidum*)، چشم (*Convolvulus arvensis*)، یونجه‌زرد (*Melilotus*)

و گلنگ (*Carthamus oxyacanthus*) (officinalis به ترتیب ۷۱، ۷۳، ۵۲ و ۶۳ درصد گردید و عملکرد دانه (۴/۸۱) تن در هکتار) را نسبت به نیمه شاهد ۲۰ درصد افزایش داد. با این وجود، کارایی علفکش فنومتری در کنترل علفهای هرز آزمایش، در مقایسه با علفکش‌های پرکاربرد اتللو، برومایسید امآ + تاپیک یا پوماسوپر کمتر بود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود این علفکش با مقادیر بیشتری ارزیابی شوند.

## کلمات کلیدی: تراکم، چشم، کنترل شیمیایی، مویان، وزن خشک

### مقدمه

علفهای هرز یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محصولات زراعی است که عمدتاً از طریق رقابت باعث افت عملکرد در گندم (*Triticum aestivum* L.) می‌گردد. مهمترین گونه‌ی غالب علفهای هرز مزارع گندم در داراب می‌توان به گلنگ (*Hirschfeldia incana* (L.)), خردل کاذب (Centaurea pallens Delile.), گل گندم (Carthamus oxyacantha L.) و سیزاب (Veronica persica), چشم یکساله (Malva neglecta Wallr.), پنیرک (Lolium rigidum L.) و سیزاب (Lagr. Foss. Mamnoie et al., 2022) اشاره کرد (Poir). از سوی دیگر، کاهش تناوب زراعی در منطقه، کشت متوالی گندم، کاربرد تعداد محدودی از علفکش‌های مصرفی با نحوه عمل مشابه و مصرف بیش از حد علفکش‌ها بویژه باریک برگ‌کش‌ها، سبب توسعه، گسترش و غالب شدن برخی گونه‌های دشوار کنترل مانند چشم (L. rigidum) در اراضی استان شده است (Mamnoie et al., 2022). چشم با تولید بیش از ۴۵ هزار بدر در متر مربع (Goggin et al., 2022) مهمترین گونه‌ی خسارت‌زای علفهای هرز گندم استان فارس به شمار می‌رود (Mamnoie et al., 2022). مقدار خسارت علفهای هرز در مزارع گندم ایران ۲۵ تا ۳۰ درصد گزارش شده است (Zare et al., 2014). از سوی دیگر، متداول‌ترین روش کنترل علفهای هرز مزارع گندم استان، استفاده از علفکش‌ها می‌باشد. بنابراین، معرفی علفکش‌های جدید با نحوه عمل متفاوت یکی از راهکارهای مدیریت علفهای هرز به شمار می‌رود.

علفکش پوماسوپر (فنوکسایروپ بی‌اتیل + مفن پایر دی‌اتیل) علفکشی سیستمیک انتخابی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات (فوپ‌ها) و بازدارنده‌های سنتز چربی است. این علفکش برای کنترل علفهای هرز باریک برگ دمروباھی (Alopecurus) در مزارع گندم و جو (Hordeum vulgare L.) توصیه شده است (Zand et al., 2019). علفکش (ludoviciana Durieu) سنکور (متربوزین) علفکشی انتخابی و سیستمیک از گروه تریازینون‌ها و بازدارنده انتقال الکترون در فتوسیستم دو می‌باشد. این

علف کش برای کنترل علف های هرز پهنه برج و برخی از باریک برج ها در مزارع سیب زمینی (*Solanum tuberosum* L.)<sup>1</sup>, *Cucumis sativus* L.<sup>2</sup>, خیار (*Cucumis carota* L.), هویج (*Daucus carota* L.), طالبی (*Saccharum officinarum* L.)<sup>3</sup>, Lemerle et al., 2019) (Glycine max L.)<sup>4</sup>, سویا (*melo* var. cantalupensis) (Zand et al., 2019), گندم و جو توصیه شده است (Lemelre et al., 1985). بر اساس گزارش های متعدد کاربرد مخلوط علف کش های سنکور با تاپیک (کلودینا فوپ پروپارژیل) کارایی مطلوبی در *Melilotus officinalis* (L.)<sup>5</sup>, یونجه زرد (*Chenopodium album* L.)<sup>6</sup>, سلمه تره (Abbas et al., 2018) کنترل خونی واش (Singh et al., 2005) (*L. temulentum*)<sup>7</sup> دارد.

علف کش آتلانتیس محصول شرکت بایر، علف کش سیستمیک، انتخابی و دو منظوره که برای کنترل علف های هرز باریک و پهنه برج گندم ثبت شده است. این علف کش از گروه شیمیایی سولفونیل اوره ها، بازدارنده استولاتکتات سینتاز<sup>1</sup>، با فرمولاسیون اُدی<sup>2</sup> و ماده مؤثره مزو سولفوروون ۱ درصد+ یدو سولفوروون ۰/۲ درصد+ مفن پایر ۳ درصد می باشد. در حالی که علف کش تیفیس فرمولاسیون گرانوله<sup>۳</sup> علف کش آتلانتیس است که محصول شرکت دوگل ترکیه با مقدار ماده مؤثره مزو سولفوروون ۳ درصد+ یدو سولفوروون ۰/۶ درصد+ مفن پایر ۹ درصد می باشد (Anonymous, 2017). در گزارشی اظهار شد با کاربرد علف کش های آتلانتیس و اتللو چشم به طور معنی دار کنترل گردید اما این علف کش ها کارایی ضعیفی (۵۰ درصد) در کنترل هفت بند (*Polygonum aviculare* L.) دارند (Ebadati et al., 2019). گزارش دیگری نشان داد، کارایی علف کش آتلانتیس و اتللو در کنترل ترشک (Anagallis arvensis L.)<sup>8</sup>, یونجه زرد (*M. officinalis*)<sup>9</sup>, آنگالیس (*M. neglecta*)<sup>10</sup>, (Rumex crispus L.)<sup>11</sup> بسیار مطلوب (۱۰۰ درصد) است (Mamnoie and Karaminejad, 2020). همچنین، با کاربرد آتلانتیس+ دوپلسان سوپر، پیچک *Zalghi* and *Phalaris* (Trifolium alexandrium L.)<sup>12</sup> و شبدر (*Convolvulus arvensis* L.)<sup>13</sup> در آزمایشی اظهار شد اختلاط علف کش های متربوزین+ فنوکسابرپوپ، وزن خشک خونی واش (Saeedipor, 2017) را به طور معنی داری کاهش یافت (Singh et al., 2005) (*minor*).

با توجه به محدود بودن تعداد علف کش های قابل دسترس، نارضایتی کشاورزان از کارایی علف کش های موجود، توسعه و گسترش برخی گونه های خسارتزا از جمله چشم (*L. rigidum*)<sup>14</sup>, این آزمایش با هدف بررسی کارایی کنترل علف های هرز گندم

<sup>1</sup> Acetolactate synthase

<sup>2</sup> Oil dispersion

<sup>3</sup> Wettable granule

بویژه چچم با استفاده از علفکش‌های پیش مخلوط فنومتری در مقایسه با علفکش‌های پرکاربرد گندم و ارزیابی خسارت احتمالی آن بر گندم انجام شد.

## مواد و روش‌ها

به منظور کنترل علف‌های هرز مزارع گندم، آزمایشی در بلوک کامل تصادفی (۱۴ تیمار با چهار تکرار) در اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب (استان فارس) در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اجرا شد. مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در جدول زیر نشان داده شده است (جدول ۱).

**جدول ۱. برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش**  
Table 1. Soil characteristics at different experimental locations

هدایت الکتریکی EC (ds.m <sup>-1</sup> )	اسیدیته pH	K <sub>2</sub> O (mg/kg)	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (mg/kg)	کربن آلی Organic C (%)	بافت خاک Soil texture
0.68	7.9	248	23	0.68	Loamy clay

تیمارهای آزمایش، مقدار کاربرد و مشخصات علفکش‌های کاربردی در جدول دو ذکر شده است (جدول ۲). لازم به ذکر است که کاربرد علفکش سنکور (۸۰۰ گرم در هکتار) طی دو مرحله انجام گردید. به طوری که ۴۰۰ گرم در هکتار به صورت زود پس رویشی (۱ تا ۳ برگی گندم)، معادل مرحله ۱۱ تا ۱۳ زادوکس (Zadoks *et al.*, 1974) و ۴۰۰ گرم در هکتار در مرحله پنجه زنی گندم (۳ تا ۵ برگی گندم)، معادل مرحله ۲۵ زادوکس (Zadoks *et al.*, 1974) انجام شد. سایر تیمارهای علفکش نیز در مرحله مرحله پنجه زنی گندم استفاده شدند. شایان ذکر است، برای سادگی در بیان نتایج بجای علفکش فنوکسaproپ پی‌ای‌تل + متري بوzin از واژه اختصاری فنومتری استفاده شد. همچنان، برای سادگی در نوشتار، کوتاه شدن واژه‌ها و نظم نوشتاري در فصل نتایج و بحث از نام‌های تجاری علفکش‌ها استفاده گردید.

**جدول ۲. اسامی تجاری، ماده موثره و مقدار مصرف علفکش‌های در آزمایش**  
Table 1. Commercial names, active ingredient and application rates of herbicides used in the experiment

نام تجاری Trade name	فرمولاسیون Formulation	ماده موثره Active ingredient (s)	مقدار مصرف (ماده موثره) Dose g.a.i. <sup>1</sup> . ha <sup>-1</sup>	مقدار مصرف (ماده تجاری) Dose L ha <sup>-1</sup>	شرکت Manufacturer
أُتللو Othello <sup>®</sup>	6% OD <sup>2</sup>	دیفلوفنیکان <sup>+</sup> یدوسولفورون متیل سدیم <sup>+</sup> مزوسولفوروں متیل <sup>+</sup> مفن پایر	96	1.6	بایر Bayer CropScience

<sup>1</sup> active ingredients

<sup>2</sup> Oil dispersion

آتلانتیس Atlantis®	12% OD	Diflufenican + Iodosulfuron-methyl-sodium+ Mesosulfuron-methyl +Mefenpyr-diethyl یدوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل + مفن پایر Iodosulfuron methyl sodium + Mesosulfuron methyl + Mefenpyr diethyl بروموکسینیل اکتانوات + امسی بی آ اتیل هگزیل استر	180	1.5	باير Bayer CropScience نوفام- Nofam
برومایسید ام +(Bromicide®MA) تاپیک® (Topik®)	40% EC <sup>1</sup> +8 % EC	ethylhexyl ester MCPA + Bromoxynil octanoate کلودینافوب پروپارژیل + کلوکینتوست Clodinafop-propargyl+ Cloquintocet بروموکسینیل اکتانوات + امسی بی آ اتیل هگزیل استر	600 + 80	1.5 + 1	بو بی ال UPL Limited
برومایسید ام +(BromicideMA®) (Puma super®) پوملسوپر	40% EC <sup>+</sup> +7.5% EW <sup>r</sup>	Bromoxynil octanoate + MCPA ethylhexyl ester فونکسایپوپ + مفن پایر Fenoxyprop-p-ethyl+ Mefenpyr یدوسولفورون سدیم + مزوسولفورون + مفن پایر Iodosulfuron methyl sodium + Mesosulfuron methyl + Mefenpyr diethyl	600 + 75	1.5 + 1	نوفام- Nofam باير Bayer
تیفیس Tifis®	36% WG <sup>r</sup>	متربوزین Metribuzin فونکسایپوپ بی اتیل + متربوزین Fenoxyprop-p-ethyl + Metribuzin	108	300	دوگل Dogal
سنکور Sencor®	70% WP <sup>r</sup>	متربوزین Metribuzin فونکسایپوپ بی اتیل + متربوزین Fenoxyprop-p-ethyl + Metribuzin	560	800	گل سم Golsam Gorgan
فونمتری** FenoMetri +**فونمتری سورفاکtant غیر یونی FenoMetri+ Non-ionic Surfactant +Topik® (Granstar®) تاپیک® (Topik®) وجین (کنترل) Weeding Control	21.37% EC 21.37% EC 80% 75% DF <sup>3</sup> +8 % EC -	+ + + + + -	171 213.7 256.5 171 213.7 256.5 15 80	0.8 1 1.2 0.8 1 1.2 20 + 1	بو بی ال UPL Limited بو بی ال UPL Limited دوپونت Dupont بوپال UPL Limited

\*\* واژه اختصاری "هنوز ثبت تجاری نشده"

کاشت گندم روی بقایای محصول قبل (پنبه) با استفاده از کارنده پشته کار<sup>4</sup> ساخت ایتالیا که دارای چهار ردیفکار به فاصله ۱۵ سانتیمتر بود، روی پشته های به عرض ۵۵ سانتیمتر و عرض جوی ۲۰ سانتیمتر انجام شد (Soljhjou and Javadi, 2013). هر کرت آزمایشی دارای ۸ خط کاشت با تراکم ۴۰۰ بوته در متر مربع و رقم چمران ۲، در ابعاد ۱/۵ × ۱۰ متر مربع در اواخر آذر ماه ۱۴۰۰ تهیه گردید. آبیاری به صورت قطره ای با نوار تیپ با فاصله قطره چکان ۲۰ سانتیمتری انجام شد. فاصله نوبت آبیاری و ساعت آبیاری بسته به شرایط آب و هوایی و مراحل رشد گیاه متفاوت بود. به طوری که نوبت آبیاری در اوایل فصل رشد به فاصله دو تا

<sup>1</sup> Emulsifiable concentrate

<sup>2</sup> Emulsion oil in water

<sup>3</sup> Water-dispersible Granule

<sup>4</sup> Wettable Powder

<sup>5</sup> Dry Flowables

<sup>6</sup> Rais bad, Model MZCS-24-300

سه هفته و در در انتهای رشد گندم (خوشه دهی تا خمیری دانه) هر ۸ تا ۱۰ روز به مدت ۵ تا ۶ ساعت به طور یکسان در تیمارها انجام شد. مراقبت‌های زراعی و کوددهی برای تیمارهای به طور یکسان و بر اساس آزمون خاک اعمال گردید. مقدار کود نیتروژن از منبع اوره به مقدار ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار (طی سه مرحله کاشت، ساقه‌دهی و خوشیده)، کودهای فسفر و پتاس به ترتیب از منبع سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به مقدار ۵۰ و ۵۰ کیلوگرم در هکتار قبل از کشت با توصیه بخش تحقیقات خاک و آب انجام شد. هر کرت آزمایشی از طول به دو بخش تقسیم گردید، قسمت بالایی سمپاشی نشده (به عنوان شاهد) و بخش پایین هر کرت سمپاشی نشده به عنوان تیمار در نظر گرفته شد. سمپاشی با سمپاش پشتی فشار ثابت مجهز به نازل بادیزی (۲۰۰۸)، با فشار دو بار و حجم پاشش آب مصرفی ۳۵۰ لیتر در هکتار اعمال گردید.

نمونه برداری شامل تعیین تراکم و وزن خشک علف‌های هرز در کادری به ابعاد  $50 \times 50$  سانتی‌متر به تفکیک گونه در هر نیم کرت شاهد و تیمار شمارش، پس از برداشت، خشک و با دقت گرم وزن شدند. درصد کاهش تراکم و وزن خشک گونه‌های علف‌های هرز (WCE)<sup>۱</sup> با استفاده از معادله یک تعیین شد (Somani, 1992). عملکرد دانه گندم و عملکرد بیولوژیک به ترتیب از خطوط وسط در ابعاد سه و نیم متر مربع در هر نیم کرت شاهد و تیمار در انتهای فصل تعیین گردید. همچنین، تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد دانه از معادله دو استفاده گردید (معادله ۲).

$$WCE = \left( \frac{A-B}{A} \right) \times 100$$

معادله [۱]

$$\% Y_i = 100 \times \frac{Y_f}{Y_w}$$

معادله [۲]

در معادله یک، WCE عبارت از درصد کارایی کنترل تراکم (وزن خشک) علف‌های هرز، A و B به ترتیب تراکم (وزن خشک) گونه علف‌های هرز در کادر سمپاشی نشده و شده است. در معادله دو  $Y_i$  % درصد تغییرات عملکرد،  $Y_f$  و  $Y_w$  به ترتیب عملکرد در نیم کرت‌های سمپاشی شده و نشده است. شایان ذکر است که تیمار شاهد و چین دستی فقط در ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه در نظر گرفته شد و در تعیین درصد کنترل علف‌های هرز از سر جمع تیمارها حذف گردید. همچنین، در تعیین تراکم و وزن خشک علف‌های هرز در متر مربع از میانگین شاهد مجاور کرتهای آزمایشی استفاده شد. آزمون نرمال بودن داده‌ها قبل از تجزیه واریانس انجام شد. محاسبات آماری و مقایسه میانگین با آزمون حداقل تفاوت معنی‌دار<sup>۲</sup> در سطح پنج درصد با استفاده از نرم افزار SAS (نسخه ۳/۹) انجام گردید.

<sup>1</sup> Weed Control Efficacy

<sup>2</sup> The least significant difference

## نتایج و بحث

### علف‌های هرز

علف‌های هرز غالب در مزرعه آزمایشی شامل چهار گونه چچم، پیچک، یونجهزرد و گلنگ وحشی بودند (جدول ۳). نتایج

نشان داد گونه چچم و گلنگ وحشی با فراوانی نسبی ۵۶ و ۵ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین غالبیت را نشان دادند (جدول ۳).

جدول ۳. فراوانی نسبی علف‌های هرز غالب موجود در مزرعه آزمایشی گندم

Table 3. Relative abundance of the dominant weeds in the experimental wheat field

نام علمی Scientific name	تیره Family	فراوانی نسبی Relative abundance (%)	میانگین تراکم Mean density (m <sup>2</sup> )	نام فارسی Persian name
<i>Lolium rigidum</i> L.	Poaceae	56.4	55	چچم
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Convolvulaceae	26.7	33	پیچک
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.	Leguminosae	10.8	13.5	یونجهزرد
<i>Carthamus oxyacanthus</i> M.B.	Asteraceae	5.1	8.5	گلنگ وحشی

نتایج جدول تجزیه واریانس صفت اندازگیری شده نشان داد که تیمارهای کاربرد علف‌کش‌ها تاثیر معنی‌دار (P < 0.01) بر

تراکم، وزن خشک، درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف‌های هرز پیچک، چچم، یونجهزرد، گلنگ و کل علف‌های هرز داشت (جداول آنالیز واریانس آورده نشد).

نتایج بدست آمده از کاربرد علف‌کش‌ها بر تراکم و درصد کنترل علف‌های هرز حاکی از آن است که با افزایش مقدار کاربرد

علف‌کش فنومتری تراکم گونه‌های چچم، گلنگ، پیچک، یونجهزرد و کل علف‌های هرز به طور معنی‌دار کاهش یافت (جدول ۴).

همچنین، وقتی ماده افزودنی با علف‌کش فنومتری استفاده شد کارایی علف‌کش در کنترل علف‌های هرز مذکور به طور معنی‌دار

افزایش یافت (جدول ۴). به طوری که کاربرد علف‌کش فنومتری (۱/۲ لیتر در هکتار) با ماده افزودنی توانست تراکم گونه‌های

علف‌های هرز پیچک، گلنگ وحشی، یونجهزرد، چچم و کل علف‌های هرز به ترتیب ۷۱، ۶۵، ۵۵، ۴۵ و ۷۰ درصد نسبت به نیمه

شاهد عدم کنترل به طور معنی‌دار کاهش دهد. در مجموع کارایی علف‌کش فنومتری (۱/۲ لیتر در هکتار ماده افزودنی) در

کنترل یونجهزرد با آتلانتیس، تیفیس و سنکور در یک گروه آماری بودند، اما کارایی این تیمار در کنترل یونجهزرد به طور معنی‌دار

کمتر از گرانستار+تاپیک، برومایسید امآ (+تاپیک یا پوماسوپر)، اتللو نشان داد. کارایی تیمار علف‌کش فنومتری (۱/۲ لیتر در هکتار)

ماده افزودنی) در کاهش تعداد گلنگ وحشی (۳/۵ بوته در متر مربع)، به طور معنی‌دار کمتر از برومایسید امآ (+تاپیک یا پوماسوپر)

و گرانستار (+تاپیک) بود، اما با سایر تیمارهای علف‌کش اختلاف معنی‌داری نداشت. همچنین کارایی فنومتری (۱/۲ لیتر در هکتار

بعلاوه ماده افزودنی) از نظر کاهش تراکم پیچک، با سایر تیمارهای علفکش‌های آزمایش در یک گروه آماری بودند و بعد از علفکش‌های سنکور و اتللو بیشترین کارایی در کنترل چشم نشان داد. در مقابل بیشترین کاهش تراکم علف‌های هرز پیچک، یونجهزرد و گلنگ به ترتیب ۸۲، ۸۵، و ۸۵ درصد نسبت به نیمه شاهد بدون کنترل بدست آمد که از کاربرد برومایسید اما در اختلاط با تاپیک یا پوماسویر حاصل گردید. از سوی دیگر، بیشترین کارایی در کاهش تراکم علف‌هرز چشم از کاربرد علفکش سنکور به مقدار ۷۸ درصد حاصل شد که با سایر تیمارها اختلاف معنی‌دار داشت (جدول ۴). نتایج آزمایشی نشان داد، کاربرد پیش مخلوط متربوزین+فنوكساپروپ یا متربوزین+کلودینافوپ پروپارژیل به طور معنی‌دار تراکم خونی واش و گونه‌های پهن برگ را کنترل نمود (Punia *et al.*, 2017).



جدول ۴. مقایسه میانگین اثر تیمارهای کاربرد علفکش‌ها بر تراکم تعداد و درصد کاهش گونه‌های علف‌های هرز نسبت به نیمه شاهد

Table 4. Mean comparison of the effect herbicide application treatments on density and the percentage decrease of weed species density compared to half of the control

تیمار Treatment	مقدار مصرف Dose (g-li/ha)	پیچک <i>C. arvensis</i>		گلنگ <i>C. oxyacanthus</i>		یونجهزد <i>M. officinalis</i>		چچم <i>L. rigidum</i>		تراکم کل علف هرز Total weed	
		تعداد ساقه عدد ساقه	کنترل (m <sup>2</sup> )	تعداد بوته عدد بوته	کنترل (m <sup>2</sup> )	تعداد بوته عدد بوته	کنترل (m <sup>2</sup> )	تعداد ساقه عدد ساقه	کنترل (m <sup>2</sup> )	تعداد بوته عدد بوته	کنترل (m <sup>2</sup> )
			(%)		(%)		(%)		(%)		(%)
FenMet	0.8	28 <sup>b</sup>	29.34 <sup>g</sup>	6 <sup>b</sup>	45.03 <sup>h</sup>	12 <sup>ab</sup>	35.48 <sup>g</sup>	47 <sup>b</sup>	25.18 <sup>g</sup>	84 <sup>b</sup>	30.22 <sup>g</sup>
FenMet	1	25 <sup>b</sup>	35.25 <sup>fg</sup>	5.5 <sup>b</sup>	50.35 <sup>gh</sup>	11 <sup>b</sup>	40.46 <sup>fg</sup>	49 <sup>ab</sup>	25.28 <sup>fg</sup>	71 <sup>b</sup>	35.14 <sup>fg</sup>
FenMet	1.2	19 <sup>ad</sup>	52.12 <sup>e</sup>	4.5 <sup>ce</sup>	55.72 <sup>eh</sup>	7 <sup>de</sup>	55.01 <sup>c-f</sup>	33 <sup>ad</sup>	35.1 <sup>d-f</sup>	54 <sup>ef</sup>	51.11 <sup>de</sup>
FenMet+ Sur	0.8+1	23 <sup>bc</sup>	40.37 <sup>f</sup>	5 <sup>b-d</sup>	52.11 <sup>fh</sup>	10 <sup>bc</sup>	45.7 <sup>eg</sup>	47 <sup>b</sup>	27.1 <sup>fg</sup>	65 <sup>ad</sup>	44.18 <sup>ef</sup>
FenMet + Sur	1+1	18 <sup>ce</sup>	56.12 <sup>e</sup>	4 <sup>df</sup>	60.01 <sup>d-g</sup>	8 <sup>ad</sup>	50.57 <sup>d-f</sup>	32 <sup>ad</sup>	41.35 <sup>b-d</sup>	50 <sup>eh</sup>	58.13 <sup>cd</sup>
FenMet + Sur	1.2+1	14 <sup>cf</sup>	71.89 <sup>bc</sup>	3.5 <sup>eg</sup>	65.7 <sup>ee</sup>	6 <sup>d-f</sup>	55.24 <sup>c-e</sup>	29 <sup>de</sup>	45.18 <sup>bc</sup>	43 <sup>gi</sup>	70.07 <sup>ab</sup>
Top.+ Bro.	1+1.5	9 <sup>gh</sup>	80.1 <sup>ab</sup>	0.75 <sup>j</sup>	85.84 <sup>a</sup>	1 <sup>h</sup>	85.32 <sup>a</sup>	30 <sup>d-e</sup>	42.28 <sup>b-d</sup>	42 <sup>h-g</sup>	71.12 <sup>ab</sup>
Top.+ Gra.	1+20	12 <sup>fh</sup>	75.94 <sup>a-c</sup>	0.75 <sup>j</sup>	85.84 <sup>a</sup>	2 <sup>gh</sup>	80.88 <sup>a</sup>	33 <sup>ad</sup>	38.15 <sup>c-e</sup>	45 <sup>eg</sup>	65.09 <sup>bc</sup>
Pum.+Bro.	1+1.5	8 <sup>h</sup>	82.01 <sup>a</sup>	1 <sup>ij</sup>	80.36 <sup>ab</sup>	1 <sup>h</sup>	85.6 <sup>a</sup>	35 <sup>ad</sup>	31.05 <sup>e-f</sup>	56 <sup>de</sup>	48.18 <sup>de</sup>
Atla.	1.5	17 <sup>d-f</sup>	60.26 <sup>de</sup>	3 <sup>f-h</sup>	65.15 <sup>c-f</sup>	5 <sup>ef</sup>	60.35 <sup>cd</sup>	38 <sup>c</sup>	29.17 <sup>eg</sup>	60 <sup>de</sup>	45.18 <sup>ef</sup>
Oth.	1.6	13 <sup>e-g</sup>	73.89 <sup>a-c</sup>	2.5 <sup>gh</sup>	70.16 <sup>b-d</sup>	2 <sup>gh</sup>	75 <sup>ab</sup>	24 <sup>e</sup>	49.15 <sup>b</sup>	40 <sup>hi</sup>	75.13 <sup>ab</sup>
Sen.	800	15 <sup>d-f</sup>	68.01 <sup>ad</sup>	2 <sup>hi</sup>	75 <sup>a-c</sup>	4 <sup>fg</sup>	65.53 <sup>bc</sup>	23 <sup>e</sup>	78.05 <sup>a</sup>	36 <sup>i</sup>	80.05 <sup>a</sup>
Tif.	300	15 <sup>d-f</sup>	68.1 <sup>ad</sup>	2.75 <sup>gh</sup>	69.87 <sup>b-d</sup>	5 <sup>ef</sup>	65.49 <sup>bc</sup>	36 <sup>ad</sup>	31.06 <sup>eg</sup>	51 <sup>eg</sup>	55.16 <sup>ce</sup>
Weedy (Mean)	-	34.5 <sup>a</sup>	-	8.5 <sup>a</sup>	-	13.5 <sup>a</sup>	-	55 <sup>a</sup>	-	120.7 <sup>a</sup>	-
LSD 0.05%		5.05	9.74	1.23	13.47	2.25	14.61	8.09	9.9	10.58	11.28

در هر سوتون میانگین‌های مریبوط به هر تیمار با حداقل یک حرف مترک فاقد اختلاف معنی دار می‌باشند. (LSD P ≤ 0.05).

In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P≤0.05)

Top. (Topik), Bro. (Bromicide®MA), Pum. (Puma super), FenMet (Fenoxaprop-p-ethyl + Metribuzin, Atla. (Atlantis), Oth. (Othello), Sen. (Sencor), Tif. (Tifis), Sur (Surfactant),

نتایج حاصل از کاربرد تیمارهای علفکش بر وزن خشک علف‌های هرز در متر مربع و درصد کاهش وزن خشک گونه‌های

علف‌های هرز نشان داد که کاربرد علفکش پیش مخلوط فنومتری توانست وزن خشک گونه‌های علف‌های هرز آزمایش را به طور

معنی دار کاهش دهد. از سوی دیگر، کاربرد ماده افزودنی با این علفکش نیز، کارایی کنترل گونه‌های گلنگ، پیچک، چچم،

یونجهزد و کل را به طور معنی دار افزایش داد. از این منظر مطلوب‌ترین مقدار کاربرد علفکش فنومتری که بیشترین کارایی در

کاهش وزن خشک علف‌های هرز مذکور داشت از کاربرد این علفکش به مقدار 1/2 لیتر در هکتار همراه با ماده افزودنی حاصل شد.

به طوری که وزن خشک گونه‌های علف‌های هرز پیچک، گلنگ وحشی، یونجهزد، چچم و کل علف‌های هرز در کاربرد علفکش

فنومتری (1/2 لیتر در هکتار بعلاوه ماده افزودنی) به ترتیب 71، 72، 52، 63، 48 و 73 درصد نسبت به نیمه شاهد به طور معنی دار کاهش

یافتند. کارایی این تیمار در کاهش وزن خشک چچم (72 گرم در متر مربع) به طور معنی دار بیشتر از آتلانتیس، تیفیس، پوماسوپر +

برومایسید امآ بود و با تیمارهای تاپیک+گرانستار، تاپیک+برومایسید امآ و اُتللو اختلاف آماری نداشت. همچنین کارایی فنومتری

(1/2 لیتر در هکتار بعلاوه ماده افزودنی) در کاهش وزن خشک پیچک با سایر علفکش‌های کاربردی تفاوت معنی داری نشان نداد.

اما از نظر کاهش وزن خشک گلنگ وحشی، با آتلانتیس، تیفیس، اُتللو و سنکور در یک گروه آماری قرار گرفت. از سوی دیگر،

کارایی فنومتری (1/2 لیتر در هکتار بعلاوه ماده افزودنی) در کنترل یونجهزد، به طور معنی دار کمتر از گرانستار (+تاپیک)، برومایسید

ام آ (+تاپیک یا پوماسوپر) و اُتللو نشان داد، اما با تیمارهای آتلانتیس، تیفیس و سنکور کارایی مشابه‌ای داشت. در مقابل، بیشترین کارایی در کنترل پیچک، گلنگ و یونجه‌زرد از کاربرد برومایسید ام آ و گرانستار در ترکیب با علفکش‌های تاپیک یا پوماسوپر مشاهد شد. همچنین، بیشترین کارایی در کنترل چچم (۸۰ درصد) از کاربرد علفکش سنکور بدست آمد که با سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشت (جدول ۵). در این ارتباط باراپور و همکاران (Barapour *et al.*, 2018) اظهار کردند که توده‌های چچم (*L. perenne*) مقاوم به علفکش دیکلوفوپ متیل، با کاربرد علفکش سنکور ۸۰ تا ۹۴ درصد کنترل گردید.

جدول ۵. مقایسه میانگین اثر تیمارهای کاربرد علفکش‌ها بر وزن خشک و درصد کاهش وزن خشک گونه‌های علف‌های هرز نسبت به نیمه شاهد

Table 5. Mean comparison of the effect herbicide application treatments on biomass and the percentage decrease of weed species biomass compared to half of the control

تیمار Treatment	مقدار مصرف Dose (g-li/ha)	پیچک <i>C. arvensis</i>		گلنگ <i>C. oxyacanthus</i>		یونجه‌زرد <i>M. officinalis</i>		چچم <i>L. rigidum</i>		تراکم کل علف هرز Total weed	
		وزن خشک (g m <sup>-2</sup> )	کاهش وزن (%)	وزن خشک (g m <sup>-2</sup> )	کاهش وزن (%)	وزن خشک (g m <sup>-2</sup> )	کاهش وزن (%)	وزن خشک (g m <sup>-2</sup> )	کاهش وزن (%)	وزن خشک (g m <sup>-2</sup> )	کاهش وزن (%)
FenMet	0.8	32.04 <sup>b</sup>	26.15 <sup>h</sup>	5.32 <sup>b</sup>	43.12 <sup>h</sup>	6 <sup>a</sup>	33.12 <sup>h</sup>	121.85 <sup>b</sup>	28.07 <sup>f</sup>	170.1 <sup>b</sup>	32.13 <sup>h</sup>
FenMet	1	27.14 <sup>c</sup>	32.12 <sup>h</sup>	5.01 <sup>b</sup>	48.05 <sup>gh</sup>	5.55 <sup>ab</sup>	38.15 <sup>gh</sup>	122.6 <sup>b</sup>	28.13 <sup>f</sup>	160.3 <sup>b</sup>	37.11 <sup>gh</sup>
FenMet	1.2	20.56 <sup>de</sup>	50.11 <sup>fg</sup>	3.84 <sup>cd</sup>	53.07 <sup>fgh</sup>	3.51 <sup>d</sup>	50.19 <sup>df</sup>	84.95 <sup>de</sup>	40.05 <sup>ce</sup>	111.05 <sup>d</sup>	53.13 <sup>ef</sup>
FenMet+ Sur	0.8+1	24.36 <sup>cd</sup>	45.14 <sup>g</sup>	4.31 <sup>c</sup>	52.21 <sup>fgh</sup>	5.18 <sup>b</sup>	42.11 <sup>fh</sup>	118.71 <sup>b</sup>	30.09 <sup>ef</sup>	135.76 <sup>c</sup>	46.08 <sup>fg</sup>
FenMet + Sur	1+1	19.51 <sup>ef</sup>	59.15 <sup>ef</sup>	3.57 <sup>d</sup>	58.19 <sup>eg</sup>	4.31 <sup>c</sup>	45.13 <sup>eg</sup>	83.16 <sup>de</sup>	43.13 <sup>bcd</sup>	105.21 <sup>df</sup>	61.12 <sup>ce</sup>
FenMet + Sur	1.2+1	14.94 <sup>gh</sup>	71.12 <sup>bcd</sup>	3.2 <sup>de</sup>	63.05 <sup>df</sup>	2.93 <sup>de</sup>	52.02 <sup>df</sup>	72.37 <sup>eg</sup>	48.11 <sup>bc</sup>	102.25 <sup>df</sup>	73.08 <sup>ac</sup>
Top.+ Bro.	1+1.5	9.77 <sup>ji</sup>	83.04 <sup>a</sup>	0.64 <sup>h</sup>	88.09 <sup>a</sup>	0.52 <sup>f</sup>	80.2 <sup>a</sup>	74.26 <sup>ef</sup>	45.12 <sup>bc</sup>	94.52 <sup>df</sup>	75.04 <sup>ab</sup>
Top.+ Gra.	1+20	12.68 <sup>hi</sup>	79.08 <sup>ab</sup>	0.65 <sup>h</sup>	87.11 <sup>a</sup>	0.96 <sup>f</sup>	78.08 <sup>ab</sup>	83.71 <sup>de</sup>	42.06 <sup>bcd</sup>	104.13 <sup>df</sup>	68.11 <sup>bcd</sup>
Pum.+Bro.	1+1.5	8.75 <sup>j</sup>	85.16 <sup>a</sup>	0.86 <sup>h</sup>	85.13 <sup>ab</sup>	0.52 <sup>f</sup>	80.11 <sup>ab</sup>	90.67 <sup>cd</sup>	34.04 <sup>df</sup>	113.85 <sup>cd</sup>	50.12 <sup>ef</sup>
Atla.	1.5	18.01 <sup>fg</sup>	62.14 <sup>de</sup>	2.63 <sup>ef</sup>	68.22 <sup>ce</sup>	2.76 <sup>de</sup>	54.11 <sup>de</sup>	98.61 <sup>c</sup>	31.1 <sup>ef</sup>	135.27 <sup>c</sup>	47.04 <sup>fg</sup>
Oth.	1.6	14.73 <sup>gh</sup>	76.11 <sup>ac</sup>	2.26 <sup>fg</sup>	73.39 <sup>bcd</sup>	0.97 <sup>f</sup>	68.15 <sup>bc</sup>	61.61 <sup>fg</sup>	52.04 <sup>b</sup>	84.74 <sup>ef</sup>	79.94 <sup>ab</sup>
Sen.	800	16.13 <sup>th</sup>	65.14 <sup>ce</sup>	1.85 <sup>g</sup>	78.06 <sup>ac</sup>	2.15 <sup>e</sup>	62.11 <sup>cd</sup>	59.45 <sup>g</sup>	80.11 <sup>a</sup>	81.56 <sup>f</sup>	83.08 <sup>a</sup>
Tif.	300	16.83 <sup>eg</sup>	65.1 <sup>ce</sup>	2.46 <sup>fg</sup>	72.02 <sup>cd</sup>	2.59 <sup>e</sup>	58.21 <sup>cd</sup>	88.36 <sup>cd</sup>	34.11 <sup>df</sup>	108.22 <sup>de</sup>	58.02 <sup>df</sup>
Weedy (Mean)	-	47.9 <sup>a</sup>	-	8. a	-	6 <sup>a</sup>	-	148 <sup>a</sup>	-	291.5 <sup>a</sup>	-
LSD 0.05%	-	3.89	11.18	0.67	12.67	0.8	11.97	13.41	10.39	23.91	12.24

در هر ستون میانگین‌های مربوط به هر تیمار با حداقل یک حرف مشترک فقدان اختلاف معنی‌دار نیست. (LSD P ≤ 0.05).

In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P≤0.05)

Top. (Topik), Bro. (Bromicide®MA), Pum. (Puma super), FenMet (Fenoxyprop-p-ethyl + Metribuzin,  
Atla. (Atlantis), Oth. (Othello), Sen. (Sencor), Tif. (Tifis), Sur (Surfactant),

بر اساس نتایج آمار توصیفی، کارایی فنومتری (۱/۲ لیتر در هکتار) + ماده افزودنی، اُتللو و سنکور در کنترل گلنگ، پیچک و یونجه‌زرد متوسط تا خوب ارزیابی شد. همچنین کارایی برومایسید ام آ+ تاپیک یا پوماسوپر در کنترل گلنگ، پیچک و یونجه‌زرد، خوب ارزیابی گردید. آتلانتیس و تیفیس کارایی نیز متوسطی در کنترل گلنگ، پیچک و یونجه‌زرد نشان دادند. بجز علفکش سنکور سایر علفکش‌ها کارایی ضعیفی در کنترل چچم داشتند (جدول ۶).

جدول ۶. ارزیابی توصیفی کارایی علفکش‌ها بر اساس کنترل جمعیت

Table 6. Descriptive assessment of herbicide efficiency for weed control population

تیمار Treatment	مقدار مصرف	گلنگ	پیچک	یونجه زرد	چچم <i>Lolium rigidum</i>
--------------------	------------	------	------	-----------	------------------------------

	L <sup>-1</sup> ha (g <sup>-1</sup> ha)	<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Carthamus oxyacanthus</i>	<i>Melilotus officinalis</i>	
FenMet.	0.8	+	-	+	-
FenMet	1	+	+	+	-
FenMet	1.2	++	++	+	+
FenMet+ Sur	0.8+1	++	++	+	-
FenMet + Sur	1+1	++	++	+	+
FenMet + Sur	1.2+1	++	+++	++	+
Top.+ Bro.	1+1.5	+++	+++	+++	+
Top.+ Gra.	1+20	+++	+++	+++	+
Pum.+Bro.	1+1.5	+++	+++	+++	+
Atla.	1.5	++	++	++	-
Oth.	1.6	++	+++	+++	+
Sen.	800	+++	++	++	+++
Tif.	300	++	++	++	+

درصد کنترل علفهای هرز: عالی (بیش از ۸۵ درصد، +++++)، خوب (۷۰ تا ۸۵ درصد، +++)، متوسط (۵۰ تا ۷۰ درصد، ++)، بدنام (۳۰ تا ۵۰ درصد، +)، بدون کنترل (کمتر از ۳۰ درصد، -) ضعیف (۳۰ تا ۵۰ درصد، +)، بدون کنترل (کمتر از ۳۰ درصد، -)

Percentage of weed control: Excellent (more than 85% , +++++), Good (70-85% , +++), moderate (50-70% , ++), weak (30-50% , +), without control (less than 30% , Top. (Topik), Bro. (Bromicide®MA), Pum. (Puma super), FenMet (Fenoxyaprop-p-ethyl + Metribuzin, Atla. (Atlantis), Oth. (Othello), Sen. (Sencor), Tif. (Tifis), Sur (Surfactant).

بر اساس گزارش موجود کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل گونه‌های علفهای هرز متفاوت است. در این ارتباط، عباس و همکاران (Abbas *et al.*, 2018) گزارش کردند که کارایی علفکش آتلانتیس در کنترل علفهای هرز پیچک و آناغالیس (Anagallis arvensis) بسیار مطلوب است. در مقابل عبادی و همکاران (Ebadati *et al.*, 2019) اظهار کردند که کارایی علفکش‌های آتلانتیس و اتللو در کنترل علف هفت‌بند (*Polygonum aviculare L.*) ضعیف است. در گزارش دیگری نیز ادعا شد با کاربرد علفکش جوی‌استیک (دیفلوفنیکان + یدوسولفورون متیل سدیم + فلوراسولام)، تراکم و وزن خشک گونه‌های گلنگ وحشی و چشم (*L. rigidum*) به طور معنی‌دار کاهش یافت (Mamnoie *et al.*, 2022). ممنوعی و کرمی نژاد (*Malva neglecta L.*) نیز معتقدند با مصرف پیش رویشی علفکش بوکسر (پروسولفوکارپ) در گندم، گونه‌های پنیرک (Karaminejad, 2020)، چشم و یونجه‌زرد به طور معنی‌دار کنترل گردید. به عقیده، بازیار و همکاران (Baziyar *et al.*, 2010) تاپیک اثری در کنترل چشم ندارد. ویسی و همکاران (Veisi *et al.*, 2018) اظهار کردند، که گونه‌های گلنگ وحشی و خردل وحشی (*Sinapis arvensis L.*) با کاربرد برومایسید ام‌آ به طور مطلوبی کنترل می‌گردد. در سایر گزارش‌ها نیز مشخص شد که کارایی علفکش سنکور در کنترل خونی‌واش، آناغالیس، یونجه‌زرد، شاهتره (*Fumaria indica*) و یولاف وحشی (Javaid *et al.*, 2022) بسیار مطلوب است. (Ghanbari *et al.*, 2015)

## عملکرد و اجزاء عملکرد دانه

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس، تیمارهای کاربرد علفکش‌ها تاثیر معنی‌دار ( $P \leq 0.01$ ) بر تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه در واحد سطح، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک دارد (جدول آنالیز واریانس آورده نشد).

با افزایش مقدار کاربرد علفکش پیش مخلوط فنومتری وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه در متر مربع، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گندم به‌طور معنی‌دار افزایش یافت. همچنین، کاربرد این علفکش با سورفاکtant غیر یونی نیز توانست صفات مذکور را به‌طور معنی‌دار افزایش دهد. به‌طوری‌که، با کاربرد علفکش فنومتری (۱/۲ لیتر در هکتار همراه با ماده افزودنی) تعداد خوشه در متر مربع، دانه در خوشه، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک به ترتیب نسبت به نیمه شاهد متناظر ۳۸، ۲۳، ۲۰ و ۲۲ درصد به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. کاربرد علفکش فنومتری (۱/۲ لیتر در هکتار همراه با کاربرد ماده افزودنی) از نظر تعداد خوشه در متر مربع (۳۴۴ پنچه بارور) و وزن هزار دانه (۳۶/۴ گرم) با سایر تیمارهای علفکش‌های کاربردی بدون تفاوت معنی‌دار در یک گروه آماری مشترک بودند. همچنین، این تیمار از نظر، تعداد دانه در خوشه (۳۸ دانه) با تیمارهای کاربرد تاپیک+برومایسید امآ، گرانستار+تاپیک، پوماسوپر+برومایسید امآ آتلانتیس و تیفیس در یک گروه آماری بودند. این تیمار از نظر، عملکرد (۴/۸۱ تن در هکتار) و عملکرد بیولوژیک (۱۱ تن در هکتار) با تیمارهای برومایسید امآ+تاپیک یا پوماسوپر، گرانستار+تاپیک، و تیفیس در یک گروه مشترک آماری قرار دارند. کاربرد علفکش‌های سنکور و اتللو بعد از وجین دستی بیشترین افزایش در عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه نشان داد. به‌طوری‌که در تیمار علفکش سنکور از نظر، تعداد خوشه در متر مربع (۴۳۳ خوشه)، دانه در خوشه (۴۱ دانه)، وزن هزار دانه (۳۷/۷ گرم)، عملکرد دانه (۶/۸ تن در هکتار) و عملکرد بیولوژیک گندم (۱۵/۶۷ تن در هکتار) با شاهد وجین دستی و اتللو در یک گروه آماری بودند که نسبت به شاهد متناظر به ترتیب ۳۳، ۲۷، ۱۰، ۴۰ و ۳۵ درصد افزایش معنی‌دار داشت (جدول ۷ و ۸). نتایج آزمایشی نیز نشان داد با کاربرد علفکش سنکور، عملکرد دانه گندم نسبت به شاهد به‌طور معنی‌داری افزایش می‌یابد (Barapour et al., 2018).

جدول ۷. مقایسه میانگین اثر تیمارهای علفکش بر وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه و درصد افزایش نسبت به نیمه شاهد

Table 7. Mean comparison of the effect of herbicide treatments on 1000 grains weight, grains per spike, number spikes and the percentage increase in compared to half of the control

تیمار Treatment	مقدار مصرف Dose L <sup>-1</sup> ha (g <sup>-1</sup> ha)	وزن هزار دانه 1000 grains weigh (g)	افزایش وزن هزار دانه Increase of 1000 grains weight (%)	تعداد دانه در خوشه No. grains/spike	افزایش تعداد دانه در خوشه Increase of grains/spike (%)	تعداد خوشه No. spikes /m <sup>2</sup>	افزایش تعداد خوشه Increase of No. spikes (%)
--------------------	--	---	---	--	--	--	--

FenMet	0.8	35.21 <sup>d</sup>	5.03 <sup>f</sup>	316.25 <sup>b</sup>	17.08 <sup>f</sup>	35 <sup>e</sup>	13.08 <sup>f</sup>
FenMet	1	35.55 <sup>cd</sup>	5.77 <sup>ef</sup>	316.25 <sup>b</sup>	19.08 <sup>ef</sup>	36.35 <sup>de</sup>	14.12 <sup>f</sup>
FenMet	1.2	36.2 <sup>bd</sup>	8.13 <sup>be</sup>	335 <sup>b</sup>	25.52 <sup>bf</sup>	38.08 <sup>be</sup>	21.61 <sup>ce</sup>
FenMet + Sur	0.8+1	35.91 <sup>cd</sup>	6.77 <sup>df</sup>	327.5 <sup>b</sup>	20.23 <sup>ef</sup>	37.15 <sup>ce</sup>	18.41 <sup>e</sup>
FenMet + Sur	1+1	36 <sup>ad</sup>	7.31 <sup>df</sup>	335 <sup>b</sup>	23.34 <sup>cf</sup>	37.65 <sup>be</sup>	21.61 <sup>ce</sup>
FenMet + Sur	1.2+1	36.42 <sup>bd</sup>	8.49 <sup>be</sup>	343.75 <sup>b</sup>	29.73 <sup>ad</sup>	38.35 <sup>be</sup>	23.3 <sup>bd</sup>
Top.+ Bro.	1+1.5	36.89 <sup>ac</sup>	8.92 <sup>ad</sup>	352.5 <sup>b</sup>	30.26 <sup>ad</sup>	39.25 <sup>ae</sup>	24.91 <sup>ac</sup>
Top.+ Gra.	1+20	36.22 <sup>bd</sup>	8.4 <sup>be</sup>	340 <sup>b</sup>	27.65 <sup>be</sup>	38.3 <sup>be</sup>	23.31 <sup>bd</sup>
Pum.+Bro.	1+1.5	37.06 <sup>ac</sup>	9.93 <sup>ac</sup>	366.25 <sup>b</sup>	32.03 <sup>ac</sup>	40.25 <sup>ad</sup>	25.42 <sup>ac</sup>
Atla.	1.5	35.94 <sup>cd</sup>	6.87 <sup>df</sup>	330 <sup>b</sup>	22.3 <sup>df</sup>	37.65 <sup>be</sup>	19.51 <sup>de</sup>
Oth.	1.6	37.17 <sup>ac</sup>	10.08 <sup>ac</sup>	426.25 <sup>a</sup>	32.79 <sup>ab</sup>	40.9 <sup>ac</sup>	26.06 <sup>ab</sup>
Sen.	800	37.71 <sup>ab</sup>	10.86 <sup>ab</sup>	433.75 <sup>a</sup>	33.52 <sup>ab</sup>	41.65 <sup>ab</sup>	27.03 <sup>ab</sup>
Tif.	300	36.52 <sup>bd</sup>	8.73 <sup>ad</sup>	363.75 <sup>b</sup>	30.75 <sup>ad</sup>	39.2 <sup>ae</sup>	23.81 <sup>bc</sup>
Weed free		38.2 <sup>a</sup>	11.58 <sup>a</sup>	441.25 <sup>a</sup>	37.03 <sup>a</sup>	43.05 <sup>a</sup>	28.11 <sup>a</sup>
LSD 0.05%		1.68	2.9	55.13	8.97	4.3	4.16

در هر ستون میانگین‌های مربوط به هر تیمار با حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف معنی‌دار می‌باشند. (LSD P ≤ 0.05).

In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P ≤ 0.05).

Top. (Topik), Bro. (Bromicide®MA), Pum. (Puma super), FenMet (Fenoxyprop-p-ethyl + Metribuzin,

Atla. (Atlantis), Oth. (Othello), Sen. (Sencor), Tif. (Tifis), Sur (Surfactant),

جدول ۸. مقایسه میانگین‌اثر تیمارهای علفکش بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک و درصد افزایش نسبت به نیمه شاهد

Table 8. Mean comparison of the effect of herbicide treatments on grain yield and biological yield and the percentage increase in compared to half of the control

تیمار Treatment	مقدار مصرف L <sup>-1</sup> ha (g <sup>-1</sup> ha)	عملکرد دانه Grain yield ton ha <sup>-1</sup>	افزایش عملکرد دانه Increase of grain yield (%)	عملکرد بیولوژیک Biological yield (ton ha <sup>-1</sup> )	افزایش عملکرد بیولوژیک Increase of biological yield (%)
FenMet	0.8	4.02 <sup>e</sup>	8.06 <sup>1</sup>	9.25 <sup>f</sup>	9.01 <sup>h</sup>
FenMet	1	4.09 <sup>e</sup>	10.08 <sup>hi</sup>	9.4 <sup>ef</sup>	11.07 <sup>gh</sup>
FenMet	1.2	4.62 <sup>de</sup>	17.07 <sup>eg</sup>	10.62 <sup>c,f</sup>	20.65 <sup>ef</sup>
FenMet + Sur	0.8+1	4.37 <sup>de</sup>	11.1 <sup>hi</sup>	10.05 <sup>ef</sup>	12.11 <sup>gh</sup>
FenMet + Sur	1+1	4.55 <sup>de</sup>	15.06 <sup>fh</sup>	10.45 <sup>cf</sup>	17.09 <sup>fg</sup>
FenMet + Sur	1.2+1	4.81 <sup>be</sup>	20.02 <sup>df</sup>	11.05 <sup>cf</sup>	22.05 <sup>df</sup>
Top.+ Bro.	1+1.5	5.11 <sup>bd</sup>	22.05 <sup>de</sup>	11.74 <sup>ee</sup>	23.11 <sup>df</sup>
Top.+ Gra.	1+20	4.72 <sup>be</sup>	19.07 <sup>df</sup>	10.85 <sup>cf</sup>	21.04 <sup>ef</sup>
Pum.+Bro.	1+1.5	5.47 <sup>b</sup>	28.02 <sup>bc</sup>	12.57 <sup>c</sup>	28.03 <sup>cd</sup>
Atla.	1.5	4.47 <sup>de</sup>	13.06 <sup>gi</sup>	10.27 <sup>cf</sup>	14.09 <sup>gh</sup>
Oth.	1.6	6.49 <sup>a</sup>	32.14 <sup>b</sup>	14.91 <sup>a</sup>	30.1 <sup>bc</sup>
Sen.	800	6.82 <sup>a</sup>	40.1 <sup>a</sup>	15.67 <sup>a</sup>	35.02 <sup>ab</sup>
Tif.	300	5.21 <sup>b</sup>	23.18 <sup>cd</sup>	11.98 <sup>c</sup>	24.08 <sup>ce</sup>
Weed free		7.26 <sup>a</sup>	45.03 <sup>a</sup>	16.69 <sup>a</sup>	40.08 <sup>a</sup>
LSD 0.05%		0.84	5.25	2.43	6.25

در هر ستون میانگین‌های مربوط به هر تیمار با حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف معنی‌دار می‌باشند. (LSD P ≤ 0.05).

In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P ≤ 0.05).

Top. (Topik), Bro. (Bromicide®MA), Pum. (Puma super), FenMet (Fenoxyprop-p-ethyl + Metribuzin,

Atla. (Atlantis), Oth. (Othello), Sen. (Sencor), Tif. (Tifis), Sur (Surfactant),

ضرایب همبستگی بین صفات اندازگیری شده نشان داد بین عملکرد دانه، تعداد خوشه در متر مربع، تعداد دانه در خوشه با

وزن خشک علفهای هرز همبستگی منفی و معنی‌داری وجود دارد (جدول ۹). به طوری که، همبستگی عملکرد دانه با وزن خشک

گونه‌های علفهای هرز چشم (r = -0.69\*\*), پیچک (r = -0.48\*\*), یونجه‌زرد (r = -0.52\*\*) بود. وزن

خشک کل علفهای هرز بیشترین همبستگی مثبت و معنی‌دار با چشم (r = +0.81\*\*) داشت. همچنین، همبستگی وزن خشک کل

علفهای هرز با وزن هزار دانه ( $r = -0.58^{**}$ )، تعداد دانه در خوشه ( $r = -0.51^{**}$ )، عملکرد دانه ( $r = -0.51^{**}$ )، عملکرد بیولوژیک ( $r = -0.62^{**}$ )، و عملکرد منفی و معنی دار مشاهده گردید (جدول ۹).

#### جدول ۹. ضریب همبستگی بین وزن خشک گونه‌های علفهای هرز با عملکرد و اجزایی عملکرد دانه


Table 9. Correlation coefficient between dry weight of weed species with yield and grain yield components

	LR	0.81**	-0.45**	-0.48**	-0.48**	-0.69**	-0.64**
	CA	0.65**	-0.50**	-0.47**	-0.30**	-0.48**	-0.47**
	MO	0.66**	-0.42**	-0.42**	-0.39**	-0.52**	-0.52**
	CO	0.61**	-0.34**	-0.43**	-0.41**	-0.48**	-0.45**
	TW	1	-0.58**	-0.51**	-0.51**	-0.62**	-0.70**
	1000G	-0.57**	1	0.74**	0.41**	0.49**	0.74**
	NG	-0.51**	0.74**	1	0.52**	0.65**	0.76**
	NS	-0.52**	0.41**	0.53**	1	0.77**	0.77**
	GY	-0.62**	0.49**	0.65**	0.77**	1	0.85**
	BY	-0.70**	0.74**	0.76**	0.77**	0.85**	1
	TW	1000G	NG	NS	GY	BY	

\*, \*\*. بیانگر معنی دار در سطح ۰/۰۵ و ۰/۰۱ می‌باشد.

LR (*Lolium regidum*), CA (*Convolvulus arvensis*), MO (*Melilotus officinalis*), CO (*Carthamus oxyacanthus*), TW (Total Weed),

1000G (1000 Grains Weigh), NG (No. Grains/Spike), NS (No. Spikes /m2), GY (Grain Yield), BY (Biological Yield),



شکل ۱- رابطه بین عملکرد دانه گندم با وزن خشک علفهای هرز  
Figure 1. The relationship between wheat seed yield and weed dry weight

تغییرات عملکرد دانه با مجموع وزن خشک علفهای هرز در واحد سطح از یک معادله درجه دوم ( $R^2 = 0.77$  پیروی)

نمود (شکل ۱). این نتیجه بیانگر آن است که با افزایش وزن خشک علفهای هرز، عملکرد دانه به طور معنی دار کاهش می‌باید.

بنابراین کنتربل علفهای هرز از طریق کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز می‌تواند از افت عملکرد جلوگیری نمود. بر اساس

نتایج آزمایش، کاربرد تیمارهای علفکش از طریق کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز چشم، پیچک، یونجه زرد، گلنگ

وحشی سبب افزایش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گندم گردید. با توجه به اینکه، کارایی علفکش‌های کاربردی آزمایش در

کنتربل گلنگ وحشی، یونجه زرد، و پیچک متوسط تا خوب ارزیابی شد. اما بجز سنکور سایر علفکش قادر به کنتربل چشم نبودند

(جدول ۶). از سوی دیگر، چشم با بیشترین فراوانی و تراکم علفهای هرز آزمایش (جدول ۳)، همبستگی مثبت و معنی داری

( $r=+0.81^{**}$ ) با وزن خشک کل علف‌های هرز داشت (جدول ۸). این نتیجه بیانگر آن است که چچم نقش مهمی در ایجاد رقابت و کاهش عملکرد دانه گندم دارد. در این ارتباط استون و همکاران (Stone *et al.*, 1998) گزارش کردند چچم با ایجاد ریشه و پنجه‌های متراکم توان رقابت زیادی با گندم دارد. با توجه به کارایی نسبتاً مشابهی علف‌کش‌های کاربردی بر گونه‌های پیچک، یونجه‌زرد، گلنگ وحشی، به نظر می‌رسد، کنترل چچم نقش تعیین کننده‌ای در انتخاب تیمار برتر آزمایش دارد. بر این اساس، علف‌کش سنکور با کنترل مطلوب چچم (۸۰ درصد) بعد از وجین دستی، بیشترین افزایش عملکرد دانه (۴۰ درصد) داشت (جدول ۸). این نتایج مؤید آن است، در شرایطی که علف‌هرز غالب مزرعه چچم باشد، کاربرد سنکور می‌تواند گزینه‌ی مناسبی در مهار و کنترل آن باشد. در این ارتباط قنبری و همکاران (Ghanbari *et al.*, 2015) نیز اظهار کردند سنکور با کنترل مطلوب علف‌های هرز قادر است عملکرد دانه گندم (۱۵ درصد) و تعداد خوشه در متر مربع (۸ درصد) افزایش دهد.

افزایش عملکرد دانه با کاربرد علف‌کش‌ها در گزارش‌های متعددی به اثبات رسیده است. در این ارتباط، مین باشی و همکاران (Minbashi *et al.*, 2022) اذعان کردند که عملکرد دانه با کاربرد علف‌کش فلوروکسی پیر ۲۳ درصد افزایش یافت. همچنین، علف‌کش‌های بوکسر (پروسولفوكارپ) (Mamnoie and Karaminejad, 2020) و جوی استیک (دیفلوفنیکان+یدوسولفورون متیل سدیم + فلوراسولام) (Mamnoie *et al.*, 2022)، گونه‌های پنیرک (*M. neglecta*), خردل کاذب (*H. incana*), گل گندم (*C. pallescens*), سیزاب (*C. oxyacantha*) و چچم (*C. persica*) به مقدار ۸۰ تا ۱۰۰ درصد کنترل نمودند و عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد خوشه در متر مربع را به طور معنی‌دار افزایش یافت. در گزارش‌های دیگر نیز مشخص شد، کاربرد گرانستار + اکسیال (Ebrahimpour *et al.*, 2011) گرانستار + پوماسوپر (Ebadi *et al.*, 2015)، تاپیک + برموکسینیل (Khan *et al.*, 2003) تاپیک + سنکور (2018)، آپیروس (سولفوسولفورون) + سنکور (Nanher *et al.*, 2015) و آتلانتیس (اصغر و همکاران (Asghar *et al.*, 2017) قادر است عملکرد دانه، دانه در خوشه و تعداد خوشه در متر مربع به طور معنی‌دار افزایش دهدند.

## جمع‌بندی کلی

بر اساس نتایج آزمایش، وزن خشک علف‌های هرز با عملکرد دانه همبستگی منفی و معنی‌داری دارد. بنابراین، کنترل علف‌های هرز می‌تواند از افت عملکرد جلوگیری کرد. به طوری که علف‌کش برومایسید آم + تاپیک (یا پوماسوپر) توانست تراکم و وزن خشک گونه‌های گلنگ وحشی، یونجه‌زرد و پیچک بیش از ۸۰ درصد کاهش دهد اما کارایی این

علف کش‌ها در کنترل چچم ضعیف (۳۰ تا ۴۰ درصد) بود. با توجه به اینکه چچم بیشترین فراوانی نسبی (۵۶ درصد) داشت، همبستگی مثبت و معنی‌داری ( $r=0.81^{**}$ ) با وزن خشک کل علف‌های هرز داشت. علف کش سنکور با کنترل مطلوب چچم (۸۰ درصد) و مجموع علف‌های هرز (۸۳ درصد) عملکرد دانه را به طور معنی دار افزایش داد. از سوی دیگر، مقادیر مختلف کاربرد علف کش فنومتری (بدون ماده افزودنی) کارایی مطلوبی در کنترل علف‌های هرز نداشت. با این وجود، کاربرد فنومتری (۱/۲ لیتر در هکتار همراه با مواد افزودنی) موجب کاهش معنی‌دار وزن خشک پیچک (۷۱ درصد)، گلنگ (۶۳ درصد)، یونجه‌زرد (۵۲ درصد) و چچم (۴۸ درصد) گردید. در مجموع کارایی علف کش فنومتری در مقایسه به علف کش‌های پر کاربرد اتللو یا اختلاط علف کش‌ها بروما یسید آ + تاپیک یا پوما سوپر در کنترل علف‌های هرز آزمایش، نتوانست برتری حاصل کند. لذا پیشنهاد می‌شود، این علف کش در مقادیر مصرف بیشتر مورد ارزیابی قرار گیرد.

سپاسگزاری: با سپاس از موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور که در حمایت مالی این این پژوهش نقش داشت. این مقاله حاصل پژوهه تحقیقاتی با شماره مصوب ۱۲۸۹-۰۰-۱۶-۰۴-۰۰ است.

## منابع

- 1- Abbas, N., Tanveer, A., Ahmad, T., & Amin, M. (2018). Use of adjuvants to optimize the activity of two broad-spectrum herbicides for weed control in wheat. *Planta Daninha* 36: e018174762. Doi: 10.1590/S0100-83582018360100126
- 2- Anonymous, (2017). *Registration report Part A. Anses. National Assessment Country France.* 102000028901 (ATLANTIS STAR). 30P Information website:[https://www.anses.fr/fr/system/files/phyto/evaluations/ATLANTISST\\_PAMM\\_2015-1606\\_PARTA.pdf](https://www.anses.fr/fr/system/files/phyto/evaluations/ATLANTISST_PAMM_2015-1606_PARTA.pdf).
- 3- Asghar, M., Ullah-Chauhdary, S., Afzal, M., Muhammad, M., Baig, Q., Qadir, M., Gafoor, A., & Zafaryab-Haider, S. (2017). Evaluation of the effectiveness of different herbicides against a new weed Japanese brome (*Bromus japonicus* Houtt.) in wheat crop. *Azarian Journal of Agriculture* 4(3): 74-79
- 4- Barapour, T., Korres, N., Bargous, N.R., Hale, R.R., Tseng T.P. (2018). Performance of Pinoxaden on the Control of Diclofop-Resistant Italian Ryegrass (*Lolium perenne* L. ssp. *multiflorum*) in Winter Wheat. *Agriculture* 8(7): 114 <https://doi.org/10.3390/agriculture8070114>

- 5- Baziyar, S., Vazan, S., Oveisi, M., & Paknezhad, F. (2010). Optimization of herbicide doses of mesosulfuron-methyl (Atlantis) and clodinafop-propargyl (Topik) in control of perennial ryegrass (*Lolium perenne* L.) in competition with wheat. *Iranian Journal of Field Crop Science* 41(4): 755-761. (In Persian with English abstract) Doi: [20.1001.1.20084811.1389.41.4.11.6](https://doi.org/10.1001.1.20084811.1389.41.4.11.6)
- 6- Ebadati, A., Gholamalipour-Alamdari, E., Avasaji, Z., & Rahemi-Karizaki, A. (2019). Effect of application time of dual-purpose herbicides and mixing herbicides on weeds control and wheat yield. *Journal of Plant Ecophysiology* 39: 192–209. [In Persian] URL: <https://www.sid.ir/FileServer/JF/6001113983916.pdf>
- 7- Ebadi, A., Parmoon, G., Samadi Calkhoran, A., & Sajed, K. (2015). Evaluation of the effect of mixture of herbicides on weeds control in rainfed bread wheat (*Triticum aestivum* L.) in Ardabil. *Iranian Journal of Crop Science* 17(3):179-192. (In Persian with English abstract).
- 8- Ebrahimpour, F., Chaab, A., Mousavi, H., & Musaviyan, N. (2011). Evaluation of management efficiency of Total® dual-purpose herbicide and mixed Granstar® and axial herbicides at different growth stages of wheat. *Electronic Journal of Crop Production* 4(2): 17-30.
- 9- Ghanbari, D., Karamineja, M.R., Farzadi, H., & Baghestani, A.M., (2015). Evaluation of the efficiency of metribuzin (WP 70%) in the control of weeds of wheat, *Triticum aestivum* L. field, *Pesticides in Plan Protection Sciences* 3(1). 13- 26 DOI: <http://dx.doi.org/10.22092/jpps.2016.106>
- 10- Goggin, D.E., Powles, S.B. & Steadman, K.J. (2012). Understanding *Lolium rigidum* Seeds: The Key to Managing a Problem Weed. *Agronomy* 2, 222-239; DOI:10.3390/agronomy2030222
- 11- Heap, I. (2022). *The international survey of herbicide resistant weeds*. Information website: <http://weedscience.com/Home.aspx> Accessed on 25/04/2022
- 12- Javaid, M.M., Mahmood, A., Bhatti, N.M.I., Waheed, H., Attia, K., Aziz, A., Nadeem, M.A., Khan, N., Al-Doss, A.A., Fiaz, S., & Wang, X. (2022). Efficacy of metribuzin doses on physiological, growth, and yield characteristics of wheat and its associated weeds, *Frontiers in Plant Science (Crop and Product Physiology)*, 13: 1-11. doi.org/10.3389/fpls.2022.866793
- 13- Khan, N., Hassan, G., Marwat, K.B., & Khan, M.A. (2003). Efficacy of different herbicides for controlling weeds in wheat crop at different times of application- II. *Asian Journal of Plant Sciences* 2(3): 310-313.
- 14- Kumar M., Kishore R., Kumar S., and Bisht S. 2018. Efficacy of different post-emergence herbicides application alone and in combination in wheat. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry* SP1: 1668-1670.

- 15- Lemerle, D., Leys, A.R., Hinkley, R.B., Fisher, J.A., & Cullis, B. (1985). Tolerance of wheat varieties to post-emergence wild oat herbicides. *Australian Journal of Experimental Agriculture* 25: 677-682.
- 16- Mamnoie, E., & Karaminejad, M.R. (2020). Evaluation time and rate application of prosulfocarb herbicide in the weed control of wheat in South Kerman. *Journal of Crop Production* 13: 51–66. DOI: 10.22069/EJCP.2020.17165.2269
- 17- Mamnoie, E., Karaminejad, M., Aliverdi, A., & Minbashi, M.M. (2022). Application efficacy of newly released pre-mixed herbicide in winter wheat: Joystick®. *Agronomia / Estonian Journal of Agricultural Science* 1(XXXIII): 123-118. DOI: 10.15159/jas.22.13
- 18- Minbashi, M.M., Hadizadeh, M.H., Karaminejad, M.R., Sabet-Zanganeh, H., Jamali, M., & Haghghi, A.A. (2022). Efficacy of fluroxypyr compared with common broadleaf herbicides in the wheat fields. *Journal of Iranian Plant Protection Research* 36 (3) 367-384, DOI: 10.22067/JPP.2022.74981.1074
- 19- Nanher, A.H., & Singh, R. (2015). Effects of weed control treatments on wheat crop and associated weeds. *Advance Research Journal of Crop Improvement* 6(2): 158-165.
- 20- Punia, S.S., Yadav, D.B., Kaur, M. & Sindhu, V.K. (2017). Post-emergence herbicides for the control of resistant littleseed canarygrass in wheat. *Indian Journal of Weed Science* 49(1): 15–19.
- 21- Singh, S., Singh, S.S. Sharma, D., Punia, S.S., & Singh, H. (2005). Performance of tank mixture of metribuzin with clodinafop and fenoxyaprop for the control of mixed weed flora in wheat. *Indian Journal of Weed Science* 37: 9-12. URL: [https://www.isws.org.in/IJWSn/File/2005\\_37\\_Issue-1&2\\_9-12.pdf](https://www.isws.org.in/IJWSn/File/2005_37_Issue-1&2_9-12.pdf)
- 22- Somani, L.I. (1992). *Dictionary of weed science*. Agronomy Publishing Academy (India) 256 pp.
- 23- Stone, M.J., Cralle, H.T., Chandler, J.M. Miller, T.D. Bovey, R.W., & Carson, K.H. (1998). Above- and below ground interference of wheat by Italian ryegrass. *Weed Science* 46:438–441.
- 24- Soljhou, A., & Javadi, A. (2013). The effect of tillage and planting methods in raised bed planting system on irrigated wheat yield. *Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi)* 110:68-74. DOI: <http://dx.doi.org/10.22092/aj.2016.109331>
- 25- Veisi, M., Baghestani, M.A., & Minbashi, M.M. (2018). Study of tank mix application of dual propose and broad leaf herbicides for weed control in wheat fields. *Iranian Journal of Field Crop Science* 49(2): 171-183.

26- Zadoks, J.C., Chang, T.T. & Konzak, C.F. (1974). A decimal code for the growth stages of cereals. *Weed Research* 14: 415-421.

27- Zalghi, Z., & Saeedipor, S. (2017). Study the efficiency of Atlantis® and its mixture with Duplosan Super an Bromicide® MA herbicides for weeds controlling of wheat. *Journal of Plant Ecophysiology* 9: 21. 165-173.

URL: [https://jpec.arsanjan.iau.ir/article\\_597307\\_8a2d5219ea402da9debcba4b686cbcd4.pdf?lang=en](https://jpec.arsanjan.iau.ir/article_597307_8a2d5219ea402da9debcba4b686cbcd4.pdf?lang=en)

28- Zand, E., Baghestani, M.A., Nezamabadi, N. & Mousavi, S.K. (2019). *A guide for herbicides in Iran*. University Press Center, 143pp. (In Persian with English summary).

29- Zare, A., Miri, H.R., & Jafari, B. (2014). Effect of plant density and reduced dosages of iodosulfuron + mesosulfuron (Atlantis) on integrated weed management in wheat. *Journal of Plant Ecophysiology* 6: 38–93 Doi: [20.1001.1.20085958.1393.6.16.4.9](https://doi.org/10.1001.1.20085958.1393.6.16.4.9)