



Research Article

Vol. 37, No. 4, 2024, p. 363-379

Studying the Combination Effect of Celery, *Apium graveolens* Extracts with *Bt*, Against Potato Tuber Moth *Phthorimaea operculella*

D. Mohammadi ^{1*}, A. Hatami ², N. Eivazian Kary ¹, R. Farshbaf Pourabad ³

1- Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

(*- Corresponding Author Email: mohamadi@azaruniv.ac.ir)

2- Ph.D. Student of Agricultural Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3- Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ege University, 35100 Izmir, Turkiye

Received: 19-03-2023

Revised: 25-07-2023

Accepted: 25-07-2023

Available Online: 25-07-2023

How to cite this article:

Mohammadi, D., Hatami, A., Eivazian Kary, N., & Farshbaf Pourabad, R. (2024). Studying the combination effect of Celery, *Apium graveolens* extracts with *Bt*, against potato tuber moth *Phthorimaea operculella*. *Journal of Iranian Plant Protection Research*, 37(4), 363-379. (In Persian with English abstract). <https://doi.org/10.22067/jpp.2023.81209.1137>

Introduction

Potato tuber moth, *Phthorimaea operculella* is an important pest of potatoes which annually impose economic loss in potato production especially in stored places. Chemical control with spray in farms and fumigation in storages is a conventional method for depressing the population of this pest. In addition, with harmful effects of synthetic pesticides on environment and human health, developing resistant population of insects, compel researchers and plant protection institutions to utilizing new safe control methods. Delaying the resistance by keeping effectiveness of pesticides by using synergists and sublethal concentrations is a resistance management method. *Bacillus thuringiensis* is an effective microbial control agent against some insects. Its effectiveness decreased because of developing resistance in some population of insects. Combination of *Bt* with some botanical biopesticides increases its efficiency that reported in many studies. In this study combination of *B. thuringiensis* with hexane, ethyl acetate and methanol extracts of Celery, *Apium graveolens* were investigated on mortality and some biological parameters of PTM. Celery is a biennial plant in the apiaceae family, which is rich in some compounds such as phenolic and flavonoids. These compounds could affect biology and physiology of insects. Combination of sublethal concentrations of *Bt* with extracts of celery subjected for study of their effects on mortality, synergistic effects and some biological parameters on PTM larvae in this paper.

Materials and Methods

Potato tuber moth colony established by preparing larvae from a health colony in department of plant protection, Azarbaijan Shahid Madani university. Larva reared on potato tubers in plastic containers. Rearing carried out in controlled condition of 26±2°C, 60% RH and a photoperiod of 16:8 (L: D) hrs.

Foliage of celery after well washing with distilled water, dried in shadow in laboratory condition. Coarsely powdered dry plants used for extraction. Extraction carried out using the maceration method with three solvents, hexane, ethyl acetate and methanol respectively. Sub-lethal concentrations of both agents, including LC₁₀, LC₃₀ and LC₅₀, individually and in combination, were assayed by the oral bioassay method. The same age and size of potato



©2023 The author(s). This is an open access article distributed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

<https://doi.org/10.22067/jpp.2023.81209.1137>

leaves were impregnated with sub-lethal concentrations of both experimental materials using the dipping method. The first larval instars of PTM were transferred on treated leaves, and mortality was recorded in 48, 96 and 144 hours' intervals. Larval developmental period and adult's emergence as an important biological parameter recorded in all treatments. In addition, the inhibitory activity of extracts on α -amylase and protease enzyme of PTM larva was considered.

Inhibitory activity of celery extracts in two concentrations 1 and 10%, on PTM larvae alpha-amylase activity was assayed by the dinitrosalicylic acid procedure, using 1% soluble starch as a substrate described by Bernfeld, (1955). And protease inhibitory activity assayed using azocasein as substrate, with comparing enzyme activity in controls and present of extracts in reactions.

All experiments were replicated three times. On-way ANOVA analysis of variance in random design was used for statistical analysis. Duncan's multiple range tests used for comparing means. For determining the synergistic, additive or antagonistic effects of combinations, chi-square test conducted between observed and expected results ($df=1$).

Results and Discussion

The results revealed that ethyl acetate extract of celery in combination with *Bt* synergistically increased the mortality of larvae. Compared to the control, the combination of methanolic extract with *Bt* didn't affect larval mortality. However, the combination of sub-lethal concentrations significantly increased larval life span compared with the control and adult emergence decreased especially in LC_{50} combinations. Increasing the mortality with exposure time progressing, observed in all combinations and the most larval mortality recorded in 144 hours' exposure time. Ethylacetate extract of celery alone and in combination with *Bt* more than other solvents affected biological parameters of PTM. Extracts in the concentration of 10 percent in reactions inhibited α -amylase and protease activity of PTM larvae by 27.97-37.77 and 11.48-25.51 percent, respectively.

Numerous researchers have reported increased efficiency of *Bt* in combination with other plant extracts for controlling various insects. The observed synergistic effects can be attributed to factors such as disrupting midgut properties, inhibiting digestive enzyme activity, and disrupting the insect's immune system by plant extracts. Inhibitory activity of celery extracts on digestive enzymes activity of PTM larva, well documented in this research which is in alignment with other reports. Effects on larval life span that with prolonging it affects population dynamics of insect pests, reported in same studies. This biological effect has adverse effect on development and physiology of insects and asynchronies developmental stage with environmental variations which finally decrease the population of next generations or overwintering insect's density. Adults and pupa emergence percentage decreased in combination of *Bt* with celery extracts that same results were reported in other researches.

Conclusion

This study aims to determine the effects of different extracts (prepared by different solvents) of celery in combination with *Bt* on potato tuber moth larvae. Effects of different solvents in separating effective compounds on PTM, was not same. In certain instances, the methanol extract of celery showed a minor effect in enhancing the potency of *Bt*. However, strong synergistic effects were observed with ethyl acetate and hexane extracts at various integrated concentrations. Time also played a crucial role in achieving the desired mortality results, with mortality and synergistic effects increasing over time in all extract combinations with *Bt*. Particularly, towards the end of the exposure period, a synergistic effect was notably observed in all integrations involving ethyl acetate extract of celery. In addition, with mortality, larval developmental period also affected by combinations. Increasing in life span observed in all treatments with different ratios. Adult emergence decreased strongly in different treatments and this is so important in decreasing the population of PTM. Because of importance of *Bt* as an effective and safe insecticide and increasing the resistance by different pests such as PTM, management of insects in integrated programs using plant extracts will improve the efficiency of *Bt*. Decreasing the sprayed concentrations in combination with other control methods are two important resistance management toll in IPM programs. Celery is a potent plant for this goal and additional studies are needed.

Keywords: Biological effects, Enzyme inhibition, Larval life span, Sublethal concentrations, Synergistic effects

مقاله پژوهشی

جلد ۳۷ شماره ۴، زمستان ۱۴۰۲، ص. ۳۶۳-۳۷۹

مطالعه اثر ترکیب عصاره گیاه کرفس، (*Apium graveolens* L. (Apiaceae)باکتری *Bacillus thuringiensis* علیه بید سیب‌زمینی،*Phthorimaea operculella* (Lep.: Gelechiidae)داود محمدی^{۱*} - اکرم حاتمی^۲ - ناصر عیوضیان کاری^۱ - رضا فرشباغ پورآباد^۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

چکیده

بید سیب‌زمینی، *Phthorimaea operculella*، یکی از آفات بسیار مهم سیب‌زمینی است که سالانه خسارات اقتصادی زیادی را در انبار و مزرعه وارد می‌کند. در این بررسی تأثیر تلفیق حشره‌کش میکروبی *Bt* با عصاره‌های هگزانی، اتیل‌استاتی و متانولی گیاه کرفس، *Apium graveolens*، بر مرگ و میر و برخی پارامترهای زیستی این آفت مطالعه شده است. عصاره‌گیری با روش خیساندن انجام گرفت. غلظت‌های زیرکشنده عوامل مورد بررسی شامل LC_{50} ، LC_{30} و LC_{10} به صورت انفرادی و در تلفیق با یکدیگر به صورت گوارشی مورد بررسی قرار گرفتند. برگ‌های هم‌سن و هم‌اندازه سیب‌زمینی در هر کدام از تیمارها غوطه‌ور شده و پس از خشک شدن در اختیار لاروهای سن اول بید سیب‌زمینی قرار گرفت. اثرات کشندگی هر غلظت و تلفیق دو عامل در فواصل زمانی ۴۸، ۹۶ و ۱۴۴ ساعت ثبت گردید. همچنین اثر مهارکنندگی عصاره‌ها بر آنزیم‌های آلفا-آمیلاز و پروتئاز لاروهای بید سیب‌زمینی نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره اتیل‌استاتی کرفس در تلفیق با باکتری *Bt* اثرات سینرژیستی بر مرگ و میر لاروها داشت. تلفیق باکتری *Bt* با عصاره متانولی اثرات کشندگی کمتری نشان داد. همچنین مشخص گردید که تلفیق غلظت‌های زیرکشنده عوامل مورد بررسی تأثیر معنی‌داری بر طول دوره رشدی لاروی داشته و به طور معنی‌داری آن را افزایش دادند. همچنین درصد ظهور حشرات کامل به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و بخصوص در تلفیق غلظت‌های LC_{50} عصاره‌ها و حشره‌کش *Bt*، به شدت کاهش یافت. نتایج مطالعات آنزیمی نشان داد که عصاره اتیل‌استاتی کرفس در غلظت ۱۰ درصد $37/77$ درصد فعالیت آنزیم پروتئاز و $25/51$ درصد فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز لاروهای بید سیب‌زمینی را مهار کردند.

واژه‌های کلیدی: اثرات زیستی، اثر سینرژیستی، دوره رشدی لاروی، غلظت‌های زیرکشنده، مهار آنزیم

۱- دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

* - نویسنده مسئول: (Email: mohamadi@azaruniv.ac.ir)

۲- دانشجوی دوره دکتری حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

۳- استاد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اگه (Ege University)، ۳۵۱۰۰، ازمیر، ترکیه

کاهش دز مصرفی، کاهش اثرات سوء، جلوگیری از بروز مقاومت و احتمال وجود اثرات هم‌افزایی مورد بررسی قرار گرفته است (Reddy Yang et al., 2018 & Chowdary, 2021). به‌عنوان نمونه، استفاده توام *Bt* و آزادیراکتین روی لارو سن سوم شب‌پره‌هندی، هم‌افزایی باعث کاهش فعالیت آنزیم‌های گوارشی، کاهش وزن لاروها و کاهش میزان پروتئین، گلیکوژن و لیپید بدن، نسبت به استفاده مجزای ترکیبات شد (Nouri-Ganbalani et al., 2016). همچنین استفاده از تلفیق *Bt* با پودر زردچوبه، *Curcuma longa* L. (Zingiberaceae)، در رژیم غذایی شیشه قرمز آرد، *Tribolium castaneum* Herbst 1797 (Col.: Tenebrionidae) موجب افزایش معنی‌دار مرگ و میر حشرات کامل در مقایسه با تک تک این عوامل گردید (Malik & Riasat, 2014). در مطالعه مشابهی استفاده توام از *Bt* و عصاره مغز دانه چریش و برگ‌های پنج انگشت چینی *Vitex negundo* L. (Verbenaceae) موجب کاهش طول دوره لاروی و شفیرگی، طول عمر و باروری حشرات کامل *Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) (Lep.: Pyralidae) شد (Senthil-Nathan et al., 2006). استفاده توام غلظت LC₅₀ حشره‌کش آزادیراکتین و *Bt* سبب کاهش وزن لارو، شفیره و افزایش مرگ‌ومیر لاروهای سن سوم کرم غوزه پنبه، *Helicoverpa armigera* Hübner (Lep.: Noctuidae) شد (Abedi et al., 2014). استفاده از *Bt* و آزادیراکتین به‌دلیل هم‌افزایی سبب کاهش تعداد لاروهای زنده مینوز گوجه‌فرنگی، *Tuta absoluta* Meyrick (Lep.: Noctuidae)، در برگ و ساقه و کاهش آلودگی در گوجه‌فرنگی شده است (Nazarpour et al., 2016).

کرفس، *Apium graveolens* L. گیاهی دوساله از تیره جعفری (Apiaceae) است که دانه‌ها و اندام‌های هوایی آن حاوی ترکیبات شیمیایی هستند که اثرات زیستی مختلفی بخصوص در حوزه علوم پزشکی به آنها نسبت داده شده است (Khalil et al., 2015). عمده ترکیبات شیمیایی اندام‌های هوایی کرفس ترکیباتی مانند لیمونن^۱، مرسین^۲، ترپینئول^۳، سلینن^۴ و پاینن^۵ می‌باشد (Kooti et al., 2014). (Rožek et al., 2016). که در مطالعات متعددی اثرات زیستی و رفتاری آنها بر حشرات مختلف گزارش شده است (Karr & Coats, 1988; Yildirim et al., 2013; Sun et al., 2020).

استفاده از غلظت‌های زیرکشنده عوامل کنترلی به‌خصوص در بحث مدیریت مقاومت و حمایت از دشمنان طبیعی اهمیت بسیار

بید سیب‌زمینی به‌عنوان یک آفت مزرعه‌ای و انباری مطرح بوده و خسارات زیادی به سیب‌زمینی وارد می‌کند (Jung et al., 2019). خسارت ۵۰ الی ۱۰۰ درصدی در کشورهای مختلفی مانند یمن، پرو، تونس، ترکیه، کنیا و هند گزارش شده است (Rodon, 2010; Alvarez et al., 2005). میزان مرجح آن سیب‌زمینی بوده اما به سایر گیاهان زراعی مانند گوجه‌فرنگی، فلفل، بادنجان، تنباکو و علف‌های هرز نظیر تاتوره نیز خسارت وارد می‌کند (Capinera, 2020). حشرات کامل در طول فصل زراعی روی اندام‌های هوایی گیاهان و گاهی روی غده‌ها تخم‌ریزی کرده و لاروها به‌صورت مینوز از برگ، دم‌برگ و ساقه تغذیه کرده، باعث صدمه دیدن اندام‌های هوایی می‌شوند. هر چند این نوع خسارت تاثیر زیادی در عملکرد نهایی ندارد، اما آلوده شدن غده‌ها، سبب کاهش کیفیت محصول و آلودگی‌های ثانویه شده و از بازارپسندی غده‌ها می‌کاهد (Alvarez et al., 2005; Rondon, 2010).

بید سیب‌زمینی به بسیاری از سموم شیمیایی معمول از قبیل ارگانوفسفاتها، کارباماتها و پایتروئیدها مقاوم شده است و کارایی روش کنترل شیمیایی با لحاظ کردن بحث امنیت غذایی و محیط زیست کم‌رنگ‌تر شده است (El-Dogramaci & Tingey, 2008; Kady, 2011). استفاده از روش‌های تلفیقی مانند کنترل زراعی، تله‌های فرمونی، کنترل بیولوژیک، گیاهان مقاوم، گیاهان تراریخته حاوی ژن دلتا-اندوتوکسین باکتری (*Bt*) *Bacillus thuringiensis*، حشره‌کش‌های گیاهی، استفاده متناوب از سموم شیمیایی از گروه‌های مختلف، تنظیم‌کننده‌های رشد حشرات و استفاده تلفیقی و توام با بیش از یک عامل کنترل می‌تواند باعث کاهش زیان اقتصادی آفت شده و اثرات مخرب کمتری روی انسان، موجودات غیرهدف و محیط‌زیست داشته باشد (Alvarez et al., 2005; Capinera, 2001).

حشره‌کش‌های گیاهی، سمیت کمتری برای انسان، موجودات غیرهدف و محیط‌زیست داشته، اغلب صدمه‌ای به گیاه وارد نکرده و تغییری در کیفیت مواد غذایی ایجاد نمی‌کنند (Ngegba et al., 2022). تاکنون مقاومت حشرات نسبت به ترکیبات گیاهی (به‌جز ترکیبات مشابه سنتز شده) گزارش نشده است (Isman, 2020). ترکیبات گیاهی به‌دلیل طبیعی و در دسترس بودن می‌توانند در برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات برای نیل به کشاورزی پایدار و تولید غذای امن مورد استفاده قرار گیرند (Opender & Walia, 2009; Kuppasamy et al., 2016).

هر چند مطالعات مختلف اثرات قابل قبول کنترلی از عصاره‌های گیاهی را نشان می‌دهد، اما در مطالعات دیگری استفاده هم‌زمان دو عامل کنترل مانند بیمارگرهای حشرات با حشره‌کش‌ها و پاتوژن‌ها با عصاره‌ها نیز با هدف کاهش مصرف سموم و هزینه‌های سم‌پاشی،

1- Limonene
2- Myrcene
3-Terpineol
4- Selinene
5- Pinen

با توجه به اهمیت بسیار بالای بید سیبزمینی به عنوان یکی از جدی ترین آفات سیبزمینی و سایر گیاهان تیره سیبزمینی و لزوم اعمال روش های کنترل غیرشیمیایی و امن تر برای انسان و محیط زیست، و ضرورت استفاده از عوامل کنترلی بخصوص عوامل با منشأ طبیعی (عصاره ها و اسانس های گیاهی) به منظور جلوگیری از بروز مقاومت احتمالی علیه باکتری *Bt*، در این بررسی تأثیر تلفیق غلظت های زیرکننده *Bt* و عصاره های مختلف کرفس بر مرگ و میر لاروهای بید سیبزمینی مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش ها

کاشت گیاه سیبزمینی

برای بررسی اثرات گوارشی عصاره های گیاهی و باکتری *Bt*^۱ از برگ های تازه سیبزمینی رقم آگریا استفاده شد. به این منظور غده های جوانه زده سیبزمینی داخل گلدان های گرد به قطر دهانه ۲۵ و ارتفاع ۳۰ سانتی متر که حاوی ماسه، خاک زراعی و کود دامی (به نسبت مساوی) بودند، کاشته شدند. دمای پرورشی 5 ± 20 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 10 ± 50 درصد انتخاب شد. گلدان ها بسته به نیاز آبیاری شده و پس از رشد مناسب گیاهان، از برگ ها جهت انجام آزمایشات استفاده شد (Hatami et al., 2022).

پرورش بید سیبزمینی

برای تهیه کلنی بید سیبزمینی، دسته تخم های تهیه شده از انسکتاریوم گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، روی غده های سیبزمینی رقم آگریا منتقل شدند. ظروف پلاستیکی مستطیلی شکل به ابعاد $10 \times 15 \times 25$ سانتی متر که کف آنها با ماسه نرم پوشانده شده بود برای پرورش انتخاب شد. پرورش در دمای 2 ± 26 درجه سلسیوس، دوره نوری ۱۶:۸ ساعت (تاریکی: روشنائی) و رطوبت نسبی 50 ± 55 درصد صورت گرفت. جهت اطمینان از یکنواخت بودن جمعیت، این حشره حداقل شش نسل در انسکتاریوم روی غده های سیبزمینی رقم آگریا پرورش یافت (Hatami et al., 2022).

تهیه عصاره های گیاهی

اندام های هوایی گیاه کرفس^۲، *A. graveolens*، از بازار سبزی و میوه تهیه شد. پس از شستشو، آبیگری خرد شده، در دمای اتاق 3 ± 25 درجه سلسیوس در شرایط سایه به مدت ۱۵ روز هوا خشک

بالایی دارد. غلظت های زیرکننده با اثراتی مانند افزایش و یا کاهش طول دوره رشدی، تغییر در نسبت جنسی، بدشکلی های مختلف، کاهش سرعت رشد جمعیت، باروری و زادآوری، تغییر در رفتار تغذیه، میزبان یابی و جفت یابی و بخصوص اثرات سینرژیستی با سایر عوامل کنترلی در بحث کاهش مصرف سموم، دارای اهمیت بسیار بالایی هستند (Lee, 2000; Stark et al., 2003; de França et al., 2017). اثرات زیرکنندگی عصاره های مختلف گیاهان نیز بر زیست-شناسی و رفتار حشرات مختلف مورد توجه محققین مختلف بوده است (Alves et al., 2013; Candido et al., 2013; Silva et al., 2016).

موضوع مقاومت حشرات به آفت کش های متداول و کاهش کارایی آنها، لزوم به کارگیری استراتژی های جایگزین و یا کاهنده سرعت بروز مقاومت در حشرات را بیش از پیش بیان می کند (Zhu et al., 2016). حشره کش میکروبی *Bt* نیز از این موضوع مستثنی نبوده و موارد متعددی از مقاومت در آفات مختلف گزارش شده است (El-kady, 2011). طبیعتاً استفاده از غلظت های بالا و افزایش تعداد دفعات استفاده از سموم شیمیایی روند بروز مقاومت را تسریع خواهد کرد. استفاده از غلظت های زیرکننده هر چند از نظر کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به عنوان یک شیوه مدیریت، به دلیل افزایش زمان حصول نتیجه قابل قبول چندان مقبول نیست، ولی مشخص شده است که استفاده از دو یا چند عامل به صورت همزمان و یا برای اهداف کنترلی مشخص در زمانهای مختلف، می تواند ضمن حصول نتیجه قابل قبول، از بروز اثرات سوء غلظت های کشنده نیز جلوگیری کند (Reddy & Chowdary, 2021). موارد متعددی از اثرات سینرژیستی تلفیق غلظت های زیرکننده آفت کش های مصنوعی و طبیعی و حتی میکروبی با یکدیگر و یا آفت کش های گیاهی گزارش شده است (Nouri-Rajguru & Sharma, 2012; Ganbalani et al., 2016; Nazarpour et al., 2016). اثرات کشندگی به همراه اثرات زیستی زیرکننده جزو نتایج موفق گزارش شده هستند. آفت کش میکروبی *Bt* جزو آفت کش های بسیار موفق و امن است که جدایه های مختلف آن علیه آفات مختلف مورد استفاده تجاری قرار گرفته است (Sánchez-Plata-Rueda et al., 2020; Sánchez-Yáñez et al., 2022). لزوم حفظ کارایی آن و جلوگیری از تسریع مقاومت در آفات مختلف با توجه به کاربرد وسیع این آفت کش احساس می شود. کاهش غلظت های مورد استفاده از *Bt* و همچنین استفاده تلفیقی با سایر عوامل کنترلی با نحوه اثر متفاوت و مهم تر از همه استفاده از پتانسیل اثرات هم افزایی به عنوان راه کارهای موثر در مدیریت مقاومت به *Bt* ذکر شده است (Khan et al., 2020). گیاه کرفس نیز به عنوان منبع متابولیت های موثر بر بیولوژی، رفتار و فیزیولوژی حشرات مختلف از پتانسیل خوبی برای استفاده در برنامه های مدیریت آفات برخوردار است (Qi et al., 2021).

۱- حشره کش میکروبی بی تورین *Bt* Var Kurstaki®، ساخت شرکت مهر آسیا بیوتکنولوژی؛ MAB Co
۲- رقم Conquistador

تعوین می‌شد. هر غلظت در ۳ تکرار در زمانهای مختلف ارزیابی شده و کل آزمایشات نیز سه بار تکرار شد. از آب مقطر به‌عنوان شاهد منفی استفاده شد. تیمارها به ژرمیناتور با دمای 25 ± 2 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 50 ± 5 درصد و دوره نوری ۱۶:۸ ساعت (تاریکی: روشنایی) منتقل شد. مرگ و میر لاروها در سه زمان ۴۸، ۹۶ و ۱۴۴ ساعت ثبت گردید (Konecka et al., 2020).

جدول ۱- غلظت‌های مورد استفاده از عصاره‌های تهیه شده با حلال‌های مختلف گیاه کرفس و حشره‌کش میکروبی Bt برای بررسی

اثرات تلفیق آنها بر لاروهای بید سیب‌زمینی

Table 1- Different concentrations of Bt and *Apium graveolens*, used for evaluating their combined effects on *Phthorimaea operculella* larva

عصاره‌ها Extracts	*LC ₁₀	LC ₃₀	LC ₅₀
هگزان Hexane	0.078	0.26	0.613
ایتیل استات Ethylacetate	0.014	0.07	0.21
متانول Methanol	3.99	9.07	16.03
Bt	0.78	1.3	1.84

*واحد غلظت‌ها: میلی‌گرم بر لیتر
*Concentration units: mg/l

بررسی برخی اثرات زیستی Bt، عصاره‌ها و تلفیق غلظت

های مختلف آنها بر لاروهای بید سیب‌زمینی

برای بررسی اثرات زیستی، شامل طول دوره رشدی لاروی و درصد ظهور حشرات کامل، غلظت‌های مورد استفاده برای بررسی اثرات کشندگی (جدول ۱) به‌صورت آزمایش مجزایی اجرا گردید. برای این منظور در ظروف پتری برگ‌های آلوده شده به هر غلظت و تلفیق غلظت‌های مورد نظر با روش غوطه‌ور کردن تیمار شده پس از خشک شدن و تبخیر آب به پتری‌های مورد نظر منتقل و روی هر برگ تعداد ۱۰ عدد لارو سن اول بید سیب‌زمینی منتقل شد. هر دو روز یکبار برگ‌های قدیمی با برگ‌های تیمار شده جدید جایگزین می‌شدند. با رشد لاروها پس از یک هفته، تراکم لاروها در پتری‌ها با اضافه کردن پتری‌های جدید تعدیل می‌شد. ثبت داده‌ها به‌صورت روزانه تا ظهور حشرات کامل در تمام تیمارها ادامه یافت (Hatami et al., 2020).

استخراج آنزیم از لاروهای بید سیب‌زمینی

به‌منظور بررسی اثرات مهارکنندگی عصاره‌های گیاهی بر آنزیم‌های گوارشی آلفا-آمیلاز و پروتئاز تام، نیاز به استخراج آنزیم لاروهای بید سیب‌زمینی بود. به‌این منظور به ازای هر ۵۰ لارو یک روزه بید سیب‌زمینی (بی‌هوش شده با استفاده از قرار دادن در فریزر)،

شدند. برای عصاره‌گیری از روش خیساندن (Maceration) استفاده شد. گیاه خشک شده اندکی خرد شده و به‌ترتیب قطبیت در حلال‌های ان-هگزان، ایتیل استات و متانول به نسبت ۱:۵ (گیاه: حلال) خیسانده شد. برای استهسال حداکثر عصاره‌ها پس از هر ۵ روز مخلوط صاف شده و مجدد از حلال استفاده می‌شد. این عمل در سه مرحله ۵ روزه انجام گرفت. در پایان عصاره استهسالی در سه مرحله باهم ادغام شده و به‌عنوان عصاره مربوط به حلال مورد نظر کدگذاری و در صورت نیاز در شرایط کاملاً تاریک نگهداری می‌شد. عصاره حل شده در حلال‌ها در نهایت صاف شده و از بقایای گیاه برای عصاره‌گیری از حلال قطبی‌تر بعدی استفاده شد. این موضوع موجب جدا شدن عصاره‌های با درجه قطبیت متفاوت می‌شود. هنگام تعویض حلال‌ها، جهت اطمینان از تبخیر کامل حلال قبلی، گیاه به مدت ۳۰ دقیقه در سایه هوادهی می‌شد (Allahverdizade & Mohammadi, 2016).

پس از اتمام دوره خیساندن و صاف کردن، به‌منظور تهیه عصاره‌های گیاهی، از دستگاه تبخیر کننده چرخشی^۱ در دمای ۴۰ درجه سلسیوس و ۲۵۰ rpm برای تمام عصاره‌ها استفاده شد. پس از بازیافت حلال، مواد رسوب یافته به‌عنوان عصاره گیاهی جمع‌آوری، توزین و در شرایط دمایی یخچال، ۴ درجه سلسیوس و شرایط تاریک برای انجام مطالعات بعدی نگهداری شدند (Handa et al., 2008).

بررسی اثرات سینرژیستی تلفیق عصاره‌های گیاهی با Bt

اثر کشندگی حشره‌کش میکروبی Bt و عصاره‌های مختلف تهیه شده از کرفس با زیست‌سنجی به روش خیساندن برگ‌های سیب‌زمینی با غلظت‌های مختلف (گوارشی) در تحقیق قبلی مشخص و از مقادیر غلظت‌های زیرکشنده حاصل از نتایج همان تحقیق در بررسی حاضر استفاده شد (Hatami et al., 2022). از سه غلظت زیرکشنده عصاره‌ها و باکتری Bt با نقطه پایانی ۲۴ ساعته شامل: LC₅₀, LC₃₀, LC₁₀ به‌منظور بررسی اثرات مختلف ممکن سینرژیستی، تجمعی و آنتاگونیستی استفاده شد (جدول ۱). غلظت‌های مختلف باکتری Bt و عصاره‌های مختلف گیاهی و همچنین ترکیبات تیماری بین آنها در آب مقطر و ۰/۰۵ درصد توئین ۸۰ تهیه شد. پس از تهیه غلظت‌ها، برگ‌های هم‌اندازه سیب‌زمینی به‌مدت ۱۰ ثانیه در محلول‌های مورد نظر فرو برده و پس از خشک شدن به پتری‌های پلاستیکی ۶ سانتی‌متری منتقل و ۵ لارو سن اول ۲۴ ساعته بید سیب‌زمینی روی برگ‌های هر پتری منتقل شد. برای هر غلظت ۵ پتری در نظر گرفته شد. دم‌برگ‌های سیب‌زمینی با استفاده از پنبه مرطوب نگاه‌داشته شده و هر ۷۲ ساعت با برگ‌های جدید تیمار شده با غلظت‌های مربوطه

۱- Rotary evaporator ساخت شرکت Heidolph

محلول روشن‌ر در ۵۴۰ نانومتر ثبت گردید. شاهد، فاقد نشاسته بود. تمام سنجش‌ها در سه تکرار انجام گرفت (Bernfeld et al., 1955). برای سنجش مهارکنندگی غلظت‌های مورد نظر عصاره‌ها (۱ و ۱۰ درصد) با آنزیم حشره به مدت ۱۰ دقیقه پیش‌انکوبه شده و بقیه مراحل مثل روش اشاره شده انجام گرفت. درصد مهارکنندگی از فرمول زیر محاسبه شد (فرمول شماره ۱):

$$(1) \quad \text{جذب در شاهد} - \text{جذب در تیمار} \times 100 = \text{مهارکنندگی} \% \\ \text{جذب در شاهد}$$

برای حصول اطمینان، اثر مهارکنندگی هر غلظت مهارکننده پنج بار تکرار شد.

از آزوکازین (Azocasein) به‌عنوان زیرنهشت^۱ برای اندازه‌گیری فعالیت پروتئاز تام استفاده شد. در یک لوله آزمایش (به‌حجم ۱۰ میلی‌لیتر) مقدار ۱۰۰ μl از محلول آنزیمی حشره، همراه ۲۰ μl بافر گلیسین (0.2 M glycine-NaOH, pH 10) حاوی ۵mM کلرید کلسیم، به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سلسیوس نگاه‌داری شد. سپس مقدار ۲۰۰ μl آزوکازین ۱٪ (w/v) اضافه شده به مدت ۶۰ دقیقه دیگر در شرایط مذکور نگاه‌داری شد تا واکنش صورت پذیرد. با اضافه کردن ۳۰۰ μl محلول ۱۰٪ Trichloroacetic acid (TCA) واکنش متوقف شد. لوله آزمایش به مدت ۲۰ دقیقه به ظرف حاوی آب یخ منتقل شده سپس به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۴ درجه سلسیوس با دور ۱۰۰۰۰ rpm سانتریفیوژ شده سپس به‌محلول سطحی حجم مساوی NaOH (IM) اضافه شد در نهایت میزان جذب نوری در طول موج ۴۵۰ نانومتر اندازه‌گیری شد. محلول شاهد با اضافه کردن حجم مساوی بافر بجای زیرنهشت تهیه شد. برای بررسی اثرات مهارکنندگی عصاره‌ها بر فعالیت آنزیم پروتئاز تام، ۱۰ دقیقه قبل از اضافه کردن سوبسترا نمونه آنزیمی با عصاره پیش‌انکوبه شده و بقیه مراحل مثل بالا انجام گرفت. درصد مهارکنندگی با استفاده از فرمول شماره ۱ محاسبه شد. برای حصول اطمینان، اثر مهارکنندگی هر غلظت مهارکننده پنج بار تکرار شد (Aghaali et al., 2013).

تجزیه و تحلیل آماری

برای بررسی اثرات مختلف تلفیق باکتری *Bt* با عصاره‌های مختلف گیاهی از روش مورد استفاده توسط کوپن هوفر و کایا (Koppenhöfer & Kaya, 1997) و با محاسبه مرگ و میر مشاهده شده و مرگ و میر قابل انتظار و بررسی اختلاف آنها با استفاده از محاسبه کیدو (χ^2) با درجه آزادی ۱ به‌صورت زیر انجام گرفت (فرمول شماره ۲):

$$M_E = M_{Bt} + M_{ex} (1 - M_{Bt}), \chi^2 = (M_{Bt_{ex}})^2 / M_E \quad (2)$$

$$D = M_{Bt \& ex} - M_E$$

یک میلی‌لیتر آب دیونیزه اضافه شده و سپس با استفاده از هموژنایزر (T18 digital ultra turrax) کاملاً یکنواخت شد. به‌مدت چهار ساعت در داخل یخچال در دمای چهار درجه سلسیوس نگهداری و سپس به مدت ۲۰ دقیقه در دمای چهار درجه سلسیوس با سرعت ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. محلول روشن‌ر بلافاصله به میکروتیوب‌های ۱/۵ میلی‌لیتری منتقل و به‌عنوان منبع آنزیم در بررسی‌های مهارکنندگی عصاره‌های گیاهی بر آنزیم‌های آلفا-آمیلاز و پروتئاز تام مورد استفاده قرار گرفت. برای یکنواختی مطالعات، یک منبع آنزیمی با حجم بالا تهیه شده و تمام مطالعات مربوط به فعالیت آنزیم‌های گوارشی و اثر مهارکنندگی عصاره‌ها با آن سنجیده شد (Mehrabadi et al., 2012).

آماده‌سازی عصاره‌های گیاهی برای بررسی اثرات مهارکنندگی

به‌منظور بررسی اثرات مهارکنندگی عصاره‌های گیاهی، غلظت‌های ۱۰ و ۱ درصد عصاره‌های گیاهی در استون و ۰/۰۵ درصد توئین ۸۰ تهیه شد. به‌منظور حذف ذرات معلق احتمالی با استفاده از فیلتر سرنگی دو بار فیلتر شده و به‌عنوان منبع مهارکننده آنزیم‌های گوارشی لاروهای بید سیب‌زمینی مورد استفاده قرار گرفت (Mehrabadi et al., 2012).

سنجش میزان مهارکنندگی عصاره‌های گیاهی بر فعالیت آنزیم‌های آلفا-آمیلاز و پروتئاز کل بید سیب‌زمینی

به‌منظور بررسی تاثیر احتمالی عصاره‌های گیاهی بر آنزیم‌های گوارشی، دو سیستم آنزیمی آلفا-آمیلاز و پروتئاز انتخاب شد. با توجه به فعال شدن پروتوکسین باکتری *Bt* تحت تاثیر آنزیم‌های پروتئاز گوارشی معده میانی و احتمال اختلال در فعالیت آنزیم‌های گوارشی این دو سیستم آنزیمی مورد مطالعه قرار گرفت. سنجش فعالیت آلفا-آمیلاز توسط دی نیترو سالیسیلیک اسید انجام گرفت. نشاسته یک درصد به‌عنوان زیرنهشت مورد استفاده قرار گرفت. ده میکرولیتر از هر نمونه آنزیمی به‌همراه ۲۰ میکرولیتر محلول نشاسته در داخل لوله‌های میکرولیتر بافر فسفات (0.2 M, pH 7) داخل بن‌ماری انکوبه شد. واکنش با افزودن ۱۰۰ میکرولیتر دی نیتروسالیسیلیک اسید متوقف شده و لوله‌های آزمایش به مدت ۱۵ دقیقه داخل آب جوش حرارت داده شده و بلافاصله به مدت پنج دقیقه داخل آب یخ قرار داده شدند. سپس داخل میکروتیوب‌های ۱/۵ میلی‌لیتری ریخته و سپس به مدت پنج دقیقه در سرعت ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. جذب

با توجه به جدول ۳، تیمار $M_{B+EA}(LC_{50}&LC_{50})$ با $93/33$ درصد مرگ‌ومیر و $25/44$ درصد هم‌افزایی، بیشترین اثر سینرژیستی در زمان ۴۸ ساعت و در سطح احتمال $0/01$ را نشان داد. همچنین تیمار $M_{B+EA}(LC_{50}&LC_{30})$ در زمان ۹۶ ساعت با $96/66$ درصد تلفات و $26/22$ درصد هم‌افزایی در سطح احتمال $0/01$ بیشترین اثر سینرژیستی نشان داد. در زمان ۱۴۴ ساعت، تیمار $M_{B+EA}(LC_{30}&LC_{30})$ با 98 درصد تلفات و $28/45$ درصد هم‌افزایی در سطح احتمال $0/01$ ، بیشترین اثر سینرژیستی را در این زمان داشته است. همچنین در بین تمام تیمارها و در سه زمان مورد مطالعه، تیمار $M_{B+EA}(LC_{30}&LC_{30})$ بیشترین اثر سینرژیستی را داشته است. در این آزمایش در زمان ۱۴۴ ساعت، ترکیب تمام غلظت‌های زیرکشنده، اثر سینرژیستی داشته و بیانگر تأثیر مثبت زمان در اثرات سینرژیستی می‌باشد. در مقایسه با عصاره هگزانی حتی در ۹۶ ساعت نیز اثرات سینرژیستی بیشتری در تلفیق غلظت‌های مختلف مشاهده گردید که بیانگر تأثیر خوب تلفیق عصاره اتیل استاتی با حشره‌کش میکروبی Bt می‌باشد.

اثر کشندگی تلفیق غلظت‌های زیرکشنده عصاره متانولی *A. graveolens* بر لاروهای بید سیب‌زمینی در زمان های مختلف

با توجه به جدول ۴، در ترکیب غلظت‌های زیرکشنده عصاره متانولی *A. graveolens* و Bt ، با افزایش مدت زمان تغذیه لاروها از برگ‌های آغشته به غلظت‌های مورد مطالعه، درصد تلفات لاروها نیز افزایش یافته است و در زمان ۱۴۴ ساعت، بیشترین درصد مرگ‌ومیر در هر یک از تیمارها مشاهده شده است.

در زمان ۴۸ ساعت تیمار $M_{B+Me}(LC_{50}&LC_{50})$ با $66/66$ درصد کشندگی و $24/99$ درصد هم‌افزایی بیشترین اثر سینرژیستی را داشته است.

در زمان ۹۶ ساعت فقط تیمار $M_{B+Me}(LC_{50}&LC_{50})$ اثر سینرژیستی داشته است. اما در زمان ۱۴۴ ساعت علاوه بر تیمار $M_{B+Me}(LC_{50}&LC_{50})$ در تیمارهای $M_{B+Me}(LC_{30}&LC_{30})$ ، $M_{B+Me}(LC_{30}&LC_{50})$ و $M_{B+Me}(LC_{50}&LC_{10})$ نیز اثر سینرژیستی مشاهده شد و تیمار $M_{B+Me}(LC_{50}&LC_{50})$ با $93/61$ درصد تلفات و $23/32$ درصد هم‌افزایی، بیشترین اثر سینرژیستی در بین تیمارها را داشته است. در بین تمام تیمارها و در سه زمان، تیمار $M_{B+Me}(LC_{50}&LC_{50})$ تمام زمان‌های مورد بررسی اثرات سینرژیستی نشان داد. همانگونه که از مقایسه جدول‌ها مشاهده می‌شود عصاره متانولی در مقایسه با دو عصاره هگزانی و اتیل‌استاتی اثرات سینرژیستی کمتری حتی با گذشت زمان نشان داده است.

که در آن M_E مرگ‌ومیر مورد انتظار، M_{Bt} میانگین درصد مرگ‌ومیر مشاهده شده در Bt ، M_{ex} میانگین درصد مرگ‌ومیر مشاهده شده در عصاره، $M_{Bt&ex}$ میانگین درصد مرگ‌ومیر مشاهده شده در اختلاط عصاره و Bt ، χ^2 فاکتور کیدو و D شاخص سینرژیستی می‌باشد. χ^2 به دست آمده با جدول کیدو و درجه آزادی یک ($df=1$) مورد مقایسه قرار گرفت. اگر مقدار عددی χ^2 کوچک‌تر از $3/84$ (جدول کیدو، درجه آزادی ۱) باشد اثر به صورت افزایشی^۱ و اگر بزرگتر از $3/84$ باشد اثر هم‌افزایی^۲ یا آنتاگونیستی^۳ است. مقدار عددی D اگر مثبت باشد اثر سینرژیستی و اگر منفی باشد آنتاگونیستی است (Koppenhöfer & Kaya, 1997).

مقیاسات میانگین با استفاده از آزمون توکی و نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. برای ترسیم اشکال از نرم‌افزار Excel استفاده شد.

نتایج

اثر کشندگی تلفیق غلظت‌های زیرکشنده عصاره هگزانی *A. graveolens* بر لاروهای بید سیب‌زمینی در زمان‌های مختلف

نتایج تأثیر تلفیق سه غلظت زیرکشنده باکتری Bt و عصاره هگزانی کرفس علیه لاروهای سن اول بید سیب‌زمینی در زمان‌های مختلف، در جدول ۲ خلاصه شده است. مرگ و میر با افزایش غلظت افزایش یافته است و روند افزایش مرگ و میر با گذشت زمان نیز مثبت می‌باشد. در ۴۸ ساعت اول، تیمار تلفیق LC_{30} حشره‌کش Bt با دو غلظت LC_{50} و LC_{30} عصاره هگزانی و تلفیق LC_{50} حشره‌کش Bt با دو غلظت LC_{50} و LC_{30} عصاره هگزانی، اثرات سینرژیستی خوبی نشان دادند. اثرات سینرژیستی بخصوص با افزایش زمان و ۱۴۴ ساعت بعد در اغلب ترکیبات تیماری مشاهده گردید. به طوری که بجز تلفیق دو غلظت LC_{10} و LC_{50} عصاره هگزانی و Bt در بقیه موارد اثرات سینرژیستی خوبی مشاهده شد (جدول ۲).

اثر کشندگی تلفیق غلظت‌های زیرکشنده عصاره اتیل‌استاتی *A. graveolens* بر لاروهای بید سیب زمینی در زمان‌های مختلف

مطابق جدول ۳ در ترکیب غلظت‌های زیرکشنده عصاره اتیل‌استاتی *A. graveolens* و Bt هم همان‌طور که انتظار می‌رفت، درصد مرگ‌ومیر با گذشت زمان افزایش پیدا کرد. این موضوع بخصوص در غلظت‌های پایین بیشتر مشهود است (جدول ۳)

- 1- Additive
- 2- Synergistic
- 3- Antagonistic

جدول ۲- مقایسه تاثیر غلظت‌های زیرکشنده عصاره هگزانی کرفس با *Bt* و تلفیق آنها علیه لاروهای سن اول بید سیب‌زمینی در زمان‌های مختلف
 Table 2- Comparing effects of sub-lethal concentration of *Bt* with *A. graveolens* hexane extract and their integrations on PTM first larval instar, during different time intervals

تیمارها Treatments		۴۸ ساعت 48 Hours			۹۶ ساعت 96 Hours			۱۴۴ ساعت 144 Hours		
<i>Bt</i>	HA*	درصد مرگ ومیر Mortality%	χ^2 **	D***	درصد مرگ ومیر Mortality%	χ^2	D	درصد مرگ ومیر Mortality%	χ^2	D
LC ₁₀	-	13.10±0.51	-	-	19.65±0.77	-	-	32.75±1.28	-	-
LC ₃₀	-	32.75±1.28	-	-	45.85±1.80	-	-	55.68±2.18	-	-
LC ₅₀	-	45.85±1.80	-	-	55.68±2.18	-	-	62.23±2.44	-	-
-	LC ₁₀	9.83±0.38	-	-	19.65±0.77	-	-	26.20±1.03	-	-
-	LC ₃₀	26.20±1.03	-	-	32.75±1.28	-	-	39.31±1.54	-	-
-	LC ₅₀	42.58±1.67	-	-	49.13±1.92	-	-	55.68±2.18	-	-
LC ₁₀	LC ₁₀	29.48±1.15	2.91	8	39.31±1.54	0.44	4	62.23±2.44	2.92	12.21
LC ₁₀	LC ₃₀	45.85±1.80	2.86	10.22	58.96±2.31	3.81	13.32	78.61±3.08	6.65	20
LC ₁₀	LC ₅₀	58.96±2.31	1.63	9.11	78.61±3.08	6.65	20	94.84±3.62	9.18	25.54
LC ₃₀	LC ₁₀	45.85±1.80	1.10	6.66	68.79±2.69	2.80	12.67	88.44±3.46	6.95	21.78
LC ₃₀	LC ₃₀	65.51±2.56	4.73	15.55	85.16±3.33	7.65	22.21	96.97±3.03	9.13	26
LC ₃₀	LC ₅₀	78.61±3.08	5.08	17.78	96.97±3.03	9.69	26.67	96.97±3.03	4.34	18.78
LC ₅₀	LC ₁₀	62.23±2.44	2.47	11.33	78.61±3.08	2.29	14.67	94.84±3.62	7.58	23.56
LC ₅₀	LC ₃₀	75.33±2.95	4.08	15.77	94.84±3.62	9.18	25.56	96.97±3.02	6.20	22
LC ₅₀	LC ₅₀	94.84±3.62	10.36	26.88	96.97±3.03	5.95	21.67	96.97±3.01	3	15.89

*عصاره هگزانی کرفس، **کیدو با درجه آزادی یک، ***شاخص تعیین کننده نوع اثر در تلفیق، اگر مقدار کیدو کوچکتر از ۳/۸۴ باشد نشان دهنده یک اثر افزایشی است، اگر مقدار کیدو از ۳/۸۴ بزرگتر باشد و مقدار عددی D مثبت باشد نشان دهنده اثر هم‌افزایی و اگر منفی باشد نشان دهنده اثر آنتاگونیستی است. مقادیر D نوشته شده به صورت ضخیم نشان دهنده اثر هم‌افزایی است.
 *Hexane extract of *A. graveolens*, ** Chi square in df=1, *** Index for determining the type of combination effect. If $\chi^2 < 3.84$ comprise an additive effect, if $\chi^2 > 3.84$ the positive and negative amounts of D, indicates synergistic and antagonistic effect respectively. Amounts of D marked as bold shows a synergistic effect.

جدول ۳- مقایسه تاثیر غلظت‌های زیرکشنده عصاره اتیل استاتی کرفس با *Bt* و تلفیق آنها علیه لاروهای بید سیب‌زمینی در زمان‌های مختلف
 Table 3- Comparing effects of sub-lethal concentration of *Bt* with *A. graveolens* ethyl acetate extract and their integrations on PTM first larval instar, during different time intervals

تیمارها Treatments		۴۸ ساعت 48 Hours			۹۶ ساعت 96 Hours			۱۴۴ ساعت 144 Hours		
<i>Bt</i>	EA*	درصد مرگ ومیر Mortality%	χ^2 **	D***	درصد مرگ ومیر Mortality%	χ^2	D	درصد مرگ ومیر Mortality%	χ^2	D
LC ₁₀	-	16.90±0.77	-	-	27.04±1.22	-	-	33.81±1.53	-	-
LC ₃₀	-	27.04±1.22	-	-	37.18±1.68	-	-	47.33±2.14	-	-
LC ₅₀	-	43.95±1.99	-	-	54.09±2.45	-	-	64.23±2.91	-	-
-	LC ₁₀	10.14±0.46	-	-	20.29±0.92	-	-	27.04±1.22	-	-
-	LC ₃₀	30.43±1.38	-	-	37.18±1.68	-	-	47.33±2.14	-	-
-	LC ₅₀	43.95±1.99	-	-	57.47±2.60	-	-	67.61±3.06	-	-
LC ₁₀	LC ₁₀	33.81±1.53	2.78	8.33	50.71±2.30	1.81	8.67	67.61±3.06	4.73	15.54
LC ₁₀	LC ₃₀	40.57±1.84	0.06	-1.66	71.00±3.21	5.05	16.45	87.90±3.98	7.66	22.21
LC ₁₀	LC ₅₀	67.61±3.06	3.65	13.88	87.90±3.98	4.98	18.44	98.43±4.59	6.35	22.23
LC ₃₀	LC ₁₀	47.33±2.14	4.71	12.65	60.86±2.76	2.30	10.67	81.14±3.67	6	19.11
LC ₃₀	LC ₃₀	64.23±2.91	4.42	14.65	81.14±3.67	6.76	20.11	95.24±4.76	11.31	28.45
LC ₃₀	LC ₅₀	77.76±3.52	5.68	18.22	94.12±4.31	8.01	24.11	95.24±4.76	3.85	17.78
LC ₅₀	LC ₁₀	60.86±2.76	2.47	11	81.14±3.67	4.79	17.32	98.04±4.44	7.58	23.5
LC ₅₀	LC ₃₀	81.14±3.67	6.41	19.65	94.12±4.31	9.76	26.22	95.24±4.76	4.75	19.55
LC ₅₀	LC ₅₀	93.01±4.13	9.53	25.43	90.67±4.70	5.12	20.21	97.78±2.22	1.7	1.22

*عصاره اتیل استاتی کرفس، **کیدو با درجه آزادی یک، ***شاخص تعیین کننده نوع اثر در تلفیق، اگر مقدار کیدو کوچکتر از ۳/۸۴ باشد نشان دهنده یک اثر افزایشی است، اگر مقدار کیدو از ۳/۸۴ بزرگتر باشد و مقدار عددی D مثبت باشد نشان دهنده اثر هم‌افزایی و اگر منفی باشد نشان دهنده اثر آنتاگونیستی است. مقادیر D نوشته شده به صورت ضخیم نشان دهنده اثر هم‌افزایی است.
 *Ethyl acetate extract of *A. graveolens*, ** Chi square in df=1, *** Index for determining the type of combination effect. If $\chi^2 < 3.84$ comprise an additive effect, if $\chi^2 > 3.84$ the positive and negative amounts of D, indicates synergistic antagonistic effect respectively. Amounts of D marked as bold shows a synergistic effect.

جدول ۴- مقایسه تاثیر غلظت‌های زیرکشنده عصاره متانولی کرفس با *Bt* و تلفیق آنها علیه لاروهای بید سیب‌زمینی در زمانهای مختلف
 Table 4- Comparing effects of sub-lethal concentration of *Bt* with *A. graveolens* methanol extract and their integrations on PTM first larval instar, during different time intervals

تیمارها Treatments		۴۸ ساعت 48 Hours			۹۶ ساعت 96 Hours			۱۴۴ ساعت 144 Hours		
<i>Bt</i>	MA*	درصد مرگ و میر Mortality%	χ^2 **	D***	درصد مرگ و میر Mortality%	χ^2	D	درصد مرگ و میر Mortality%	χ^2	D
LC ₁₀	-	1.88±0.94	-	-	6.80±0.27	-	-	17.01±0.68	-	-
LC ₃₀	-	17.01±0.68	-	-	23.82±0.96	-	-	34.02±1.37	-	-
LC ₅₀	-	30.63±1.23	-	-	37.42±1.50	-	-	51.04±2.05	-	-
-	LC ₁₀	3.40±0.14	-	-	10.21±0.41	-	-	20.42±0.82	-	-
-	LC ₃₀	6.80±0.27	-	-	17.01±0.68	-	-	27.22±1.09	-	-
-	LC ₅₀	17.01±0.68	-	-	27.22±1.09	-	-	40.83±1.64	-	-
LC ₁₀	LC ₁₀	10.21±0.41	13.36	6.67	23.82±0.96	3.36	7.33	44.23±1.78	3	10
LC ₁₀	LC ₃₀	13.61±0.55	6.68	6.67	27.22±1.09	0.89	4.44	47.63±1.91	1.55	7.78
LC ₁₀	LC ₅₀	27.22±1.09	6	10	40.83±1.64	2.26	8.45	64.65±2.60	3.55	13.32
LC ₃₀	LC ₁₀	23.82±0.96	0.78	3.89	37.42±1.50	1.03	5.65	61.25±2.46	3.81	13.34
LC ₃₀	LC ₃₀	30.63±1.23	2.73	7.78	44.23±1.78	1.44	7.22	68.05±2.74	4.73	15.54
LC ₃₀	LC ₅₀	37.42±1.50	1.22	6.11	57.84±2.33	3.79	12.85	81.67±3.28	6.65	20
LC ₅₀	LC ₁₀	40.83±1.64	1.81	7.66	54.44±2.19	2.48	10.32	78.26±3.15	4.62	16.66
LC ₅₀	LC ₃₀	44.23±1.78	2.16	8.65	61.25±2.46	3.46	12.78	81.67±3.27	4.38	16.67
LC ₅₀	LC ₅₀	68.05±2.74	14.95	24.96	78.26±3.15	9.97	23.11	93.61±3.61	7.78	23.32

*عصاره متانولی کرفس، ** کیدو با درجه آزادی یک، *** شاخص تعیین کننده نوع اثر در تلفیق، اگر مقدار کیدو کوچکتر از ۳/۸۴ باشد نشان دهنده یک اثر افزایشی است، اگر مقدار کیدو از ۳/۸۴ بزرگتر باشد و مقدار عددی D مثبت باشد نشان دهنده اثر هم‌افزایی و اگر منفی باشد نشان دهنده اثر آنتاگونیستی است. مقادیر D نوشته شده به صورت ضخیم نشان دهنده اثر هم‌افزایی است.
 *Methanol extract of *A. graveolens*, ** Chi square in df=1, *** Index for determining the type of combination effect. If $\chi^2 < 3.84$ comprise an additive effect, if $\chi^2 > 3.84$ the positive and negative amounts of D, indicates synergistic antagonistic effect respectively. Amounts of D marked as bold shows a synergistic effect.


غلظت‌های مختلف دو عامل به مراتب بیشتر از تک تک عوامل درصد ظهور حشرات کامل را کاهش داد. تلفیق غلظت LC₅₀ حشره‌کش *Bt* با همان غلظت عصاره هگزانی، اتیل‌استاتی و متانولی به ترتیب ۳، ۳ و ۲۱ درصد، ظهور حشرات کامل نشان دادند که کمترین میزان در بین ترکیبات تیماری مختلف بود. تمام ترکیبات تیماری مورد بررسی تاثیر معنی‌داری بر کاهش درصد ظهور حشرات کامل داشتند و بخصوص عصاره متانولی کرفس به‌طور مشخصی در کاهش ظهور حشرات کامل مؤثر بود.

نتایج درصد مهارکنندگی آنزیم آلفا-آمیلاز و پروتئاز تام لاروهای بید سیب‌زمینی، توسط عصاره‌های مختلف کرفس
 نتایج مهارکنندگی عصاره‌های گیاهی در جدول ۵ خلاصه شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود به ترتیب عصاره اتیل‌استاتی، هگزانی و متانولی کرفس موجب مهار ۲۵/۵۱، ۱۳/۸۸، و ۱۱/۴۸ درصدی آنزیم آلفا-آمیلاز بید سیب‌زمینی شده است و در غلظت‌های یک درصد نیز عصاره اتیل‌استاتی بیشترین اثر مهارکنندگی را نشان داد. همچنین عصاره اتیل‌استاتی در غلظت ۱۰ درصد بیشترین اثر مهارکنندگی را بر آنزیم پروتئاز دارد و نزدیک ۳۸ درصد فعالیت آن‌را مهار کرده است. عصاره هگزانی و متانولی بدون اختلاف معنی‌داری در مرتبه بعدی حدود ۲۸ درصد فعالیت آنزیم پروتئاز را مهار کرده است. ولی در غلظت یک درصد بیشترین اثر مهارکنندگی در عصاره هگزانی مشاهده شد.

تأثیر غلظت‌های زیرکشنده عصاره‌های گیاهی و تلفیق آنها

با *Bt* بربرخی شاخص‌های زیستی بید سیب‌زمینی


همان‌گونه که در شکل ۱ مشاهده می‌شود تغذیه لاروهای بید سیب‌زمینی از برگ‌های تیمار شده با غلظت‌های زیرکشنده *Bt* و عصاره‌های مختلف گیاه کرفس تأثیر معنی‌داری از نظر آماری بر طول دوره رشدی آنها دارد ($F_{24, 84} = 22.49$, $p < 0.0001$). همان‌گونه که مشاهده می‌شود، تقریباً در تمام موارد، طول دوره رشدی تیمارها بیشتر از شاهد است. بیشترین میزان افزایش، در تلفیق غلظت LC₅₀ حشره‌کش *Bt* با غلظت مشابه عصاره‌های هگزانی و اتیل‌استاتی کرفس مشاهده شد. تلفیق این غلظت‌ها طول دوره رشدی لاروی را تا ۲۵ روز در مقایسه با شاهد افزایش داده است. در تلفیق غلظت‌های LC₃₀ حشره‌کش *Bt* با غلظت‌های LC₅₀ عصاره‌ها نیز به‌طور معنی‌داری طول دوره رشدی افزایش یافته است و بین ۴/۵ الی ۱۲ روز در مقایسه با شاهد افزایش ثبت گردید که نشان دهنده تاثیر معنی‌دار تلفیق آنها در مقایسه با تک تک این عوامل است (شکل ۱). همچنین تلفیق غلظت LC₅₀ حشره‌کش *Bt* با غلظت LC₃₀ عصاره‌های گیاهی نیز ۹ الی ۱۰ روز در مقایسه با شاهد طول دوره رشدی لاروی را افزایش داده است این در حالی است که خود این عوامل به تنهایی تأثیر کمتری بر طول دوره رشدی داشتند (افزایش ۲/۵ الی ۵ روز). عصاره‌های گیاهی، *Bt* و تلفیق غلظت‌های مختلف زیرکشنده آنها تأثیر بسیار معنی‌داری بر درصد ظهور حشرات کامل در مقایسه با شاهد نیز داشتند ($F_{24, 84} = 83.26$, $p < 0.0001$) (شکل ۲). تلفیق



شکل ۱- تأثیر غلظت‌های زیر کشنده عصاره‌های مختلف کرفس، *Bt* و تلفیق آنها بر طول دوره رشدی بید سیب زمینی (حروف مشابه بر روی هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختلاف آماری معنی دار در سطح احتمال ۵٪ می‌باشد).

Figure 1- Effects of sub-lethal concentrations of *Bt*, *A. graveolens* and their combinations on Larval developmental time (days) of PTM

(The same letters in each bars considers as non-significant statistically ($p=0.05$)).



شکل ۲- درصد ظهور حشرات کامل بید سیب زمینی در اثر تغذیه لاروها از غلظت‌های زیر کشنده عصاره‌های کرفس، *Bt* و تلفیق آنها (حروف مشابه بر روی هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختلاف آماری معنی دار در سطح احتمال ۵٪ می‌باشد).

Figure 2- Percent adult emergence of PTM which feed with sub-lethal concentrations of *Bt*, *A. graveolens* extracts and their combinations

(The same letters on each bar considers as non-significant statistically ($p=0.05$)).

جدول ۵- درصد مهارکنندگی آنزیم‌های آلفا-آمیلاز و پروتئاز کل لاروهای بید سیب‌زمینی با غلظت‌های مختلف عصاره‌های کرفس

Table 5- Alpha-amylase and protease inhibitory activity of different concentrations of *A. graveolens* extracts on PTM larvae

آنزیم Enzyme	غلظت عصاره Extract concentration	مهارکنندگی عصاره‌های گیاه کرفس <i>A. graveolens</i> extracts inhibitory activity		
		هگزان Hexane	اتیل استات Ethylacetate	متانول Methanol
		آلفا-آمیلاز α -amylase	10%	13.88±2.87 ^{b*}
پروتئاز Protease	1%	6.26±1.08 ^b	11.31±2.61 ^b	6.34±1.29 ^b
	10%	28.77±6.64 ^{ab}	37.77±5.46 ^a	27.97±3.21 ^{abc}
	1%	18.99±4.75 ^{abc}	6.20±5.66 ^c	10.84±3.74 ^{bc}

*حروف مشابه در هر سیستم آنزیمی نشان دهنده عدم وجود اختلاف آماری معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ می‌باشد.

*The same letters in each enzyme system considers as non-significant statistically (p=0.05)

بحث

است. با توجه به اهمیت بالای سیستم آنزیمی پروتئاز در رشد و نمو لاروهای بید سیب‌زمینی و با توجه به نتایج تحقیقات مشابه، مهار این آنزیم توسط عصاره گیاهی از دلایل عمده اثرات سینرژیستی مشاهده شده در تحقیق حاضر است.

کاهش فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز نیز به‌عنوان عاملی مؤثر در برهم خوردن تعادل هضم و جذب در معده میانی لاروهای بید سیب‌زمینی می‌تواند نقش مؤثری در نتایج کشندگی مشاهده شده ایفا کند. آنزیم آلفا-آمیلاز با هضم نشاسته، قند مورد نیاز برای فعالیت و رشد و نمو لارو را فراهم می‌کند (Da Lage, 2018; Yazdani et al., 2010). با توجه به اینکه قند اولین منبع سوخت و ساز سلولی در حشرات است، عدم دریافت مقادیر مورد نیاز می‌تواند اثرات مخرب زیستی و فیزیولوژیکی بر لاروها داشته باشد (Hussain Shah, 2017; Schoor et al., 2020). با توجه به اینکه اثر مهارکنندگی آنزیم آلفا-آمیلاز و آلفا-گلوکوزیداز عصاره‌های مختلف کرفس اثبات شده است (Zhang et al., 2022) و در بررسی حاضر نیز نتیجه مشابهی مشاهده گردید، شاید بتوان دلیل افزایش تأثیر *Bt* در تلفیق با عصاره‌های مختلف را مهار آنزیم آلفا-آمیلاز لاروهای بید سیب‌زمینی بیان نمود. بهبود کارایی *Bt* در تلفیق با عصاره اتانولی برگ سرو نقره‌ای، *Cupressus arizonica* (Greene)، علیه کرم برگ‌خوار چغندر قند، *Spodoptera exigua* Hübner (Lep.: Nuctoidae) در مطالعه محمدی و همکاران (Mohammadi et al., 2020) گزارش شده است. تلفیق غلظت‌های زیرکشنده دو عامل، کارایی تبدیل غذای خورده شده (ECI¹) را تحت تأثیر قرار داده و نتیجه آن کاهش ظهور شفیره و حشرات کامل کرم برگ‌خوار چغندر قند در مقایسه با شاهد بود که با نتایج تحقیق حاضر از نظر نتیجه مشاهده شده هم‌خوانی دارد.

در بررسی حاضر، گذشته از دلیل اثرات سینرژیستی مشاهده شده، نتیجه اثرات زیرکشنندگی نیز بسیار با ارزش بود. طول دوره رشدی

افزایش تأثیر حشره‌کش میکروبی *Bt* در تلفیق با عصاره‌های گیاهی در مطالعات متعددی گزارش شده است که مؤید پتانسیل بالای استفاده از اثرات تلفیقی این عوامل برای افزایش کشندگی *Bt* می‌باشد (Nouri-Ganbalani et al., Rajguru et al., 2011). هر چند مکانیسم عمل دقیق اثر تلفیق *Bt* با عصاره گیاهان، بر مرگ و میر حشرات مشخص نیست، ولی با توجه به مطالعات متعدد صورت گرفته، اختلال در سامانه گوارشی، مهار آنزیم‌های گوارشی، ضعف لاروها در اثر سوء تغذیه، تأثیر بر سیستم ایمنی و حتی تأثیر بر سیستم عصبی حشرات توسط ترکیبات گیاهی به‌عنوان مکانیسم عمل، در نتایج تحقیقات زیادی گزارش شده است (Singh; El-Wakeil, 2013; Ali et al., 2021; Rattan, 2010; Madasamy, et al., 2023). براساس نتایج بدست‌آمده در تحقیق حاضر، عصاره اتیل‌استاتی کرفس، آنزیم پروتئاز لاروهای بید سیب زمینی را تا ۳۸ درصد مهار کرد و اثرات کشندگی بالایی نیز در مقایسه با سایر عصاره‌ها ثبت گردید. هر چند به‌طور یقین نمی‌توان دلیل افزایش فعالیت *Bt* در تلفیق با عصاره‌های گیاهی به اثر مهارکنندگی آنها بر آنزیم‌های پروتئاز نسبت داد چون در موارد متعددی مشخص شده است که فعالیت پروتئولایتیک معده میانی برای فعال نمودن پروتوکسین باکتری لازم و ضروری است (Talaie-Visweshwar et al., 2018; Hassanloui et al., 2014) ولی یکی از دلایل احتمالی افزایش تأثیر *Bt* در تلفیق با عصاره قلمداد می‌شود. تأثیر مهارکننده‌های آنزیمی پروتئاز در تلفیق با حشره‌کش میکروبی *Bt* علیه کرم غوزه پنبه، *H. armigera* و بررسی و مشخص گردید اکثر مهارکننده‌ها اثر سینرژیستی بر مرگ و میر لاروهای این آفت دارند (Gujar et al., 2004). همچنین در بررسی مشابهی (Mesén-Porras et al., 2020) اثر سینرژیستی کشندگی مهارکننده استخراج شده از سویا با *Bt* علیه سوسک قهوه، *Hypothenemus hampei* (Ferrari, 1867) (Col.: Curculionidae) اثبات شده

از مشاهدات مهم تحقیق حاضر، تفاوت در تأثیر کشندگی و زیرکشندگی عصاره‌های مختلفی بود که با استفاده از حلال‌های مختلف تهیه شده بود. به طوری که عصاره اتیل‌استاتی بهتر از دو عصاره دیگر عمل کرد و عصاره متانولی در مجموع کارایی کمتری در مقایسه با عصاره‌های دیگر از خود نشان داد. گیاهان منابعی غنی از متابولیت‌های مختلف هستند. هر متابولیتی با توجه به ماهیت شیمیایی خود میزان حلالیت متفاوتی در حلال‌های با درجات قطبی مختلف نشان می‌دهد (Le et al., 2018; Lezoul et al., 2020). اتیل‌استات ماهیت نسبتاً قطبی دارد و متانول قطبیت بیشتری در مقایسه با آن دارد و هگزان ترکیب غیرقطبی است (Dirar et al., 2019). با توجه به فرایند عصاره‌گیری به نظر می‌رسد هر حلال ترکیبی با قطبیت مشابه خود را از مجموع ترکیبات موجود در گیاهان استخراج کند (Lezoul et al., 2020). به عبارتی با توجه به اثرات بهتر عصاره استخراجی با استفاده از اتیل‌استات این حلال ترکیبات فعال و موثر بر این آفت را به میزان بیشتری در مقایسه با سایر حلال‌ها استخراج کرده است. تفاوت در ترکیبات و اثرات عصاره‌های استخراج شده توسط حلال‌های مختلف مشخص شده است (Zhang et al., 2022). ترکیبات شیمیایی عمده که از اسانس برگ‌های کرفس بدست آمده است لیمون و میرسن است که در مجموع بیش از ۸۰ درصد ترکیبات را به خود اختصاص داده‌اند (Kooti et al., 2014; Rožek et al., 2016). لیمون به عنوان یک ترکیب مؤثر بر رفتار و بیولوژی حشرات مختلف در مطالعات متعددی گزارش شده است (Ibrahim et al., 2001; Dekebo et al., 2019). لیمون یک ترین غیرمحلول در آب است که اثرات تدخینی، گوارشی و مهارکنندگی آن بر سیستم‌های آنزیمی گوارشی در مطالعات مختلف گزارش شده است (Koul et al., 2008; Karr & Coats, 1988; Dolores Ibáñez et al., 2020; Theochari et al., 2020). احتمال تأثیر عصاره اتیل‌استاتی کرفس بر لاروهای بید سیب‌زمینی را می‌توان به حضور این ترکیبات نسبت داد. در مجموع با توجه به اثرات کشندگی و زیرکشندگی تلفیق عصاره‌های مختلف کرفس با حشره‌کش میکروبی *Bt*، با مطالعات تکمیلی می‌توان از این تلفیق در مدیریت بید سیب‌زمینی استفاده کرد. با توجه به امنیت نسبی و اثرات سینرژیستی مشاهده شده، عصاره کرفس از پتانسیل لازم برای این امر برخوردار است.

سپاسگزاری

این مقاله حاصل بخشی از نتایج پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حشره‌شناسی کشاورزی است که با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام گرفته است که بدین وسیله از همکاری معاونت محترم تقدیر و تشکر می‌گردد. همچنین از

لاروی بخصوص در غلظت‌های LC₅₀ عصاره‌ها و *Bt* افزایش چشم‌گیری داشت و در نهایت درصد بسیار پایینی از لاروها موفق به طی دوره شفیرگی شده و به مرحله ظهور حشره کامل رسیدند. این موضوع بخصوص از نظر پویایی جمعیت و کاهش معنی‌دار در ظهور حشرات کاملی که نسل بعدی را بوجود خواهند آورد اهمیت دارد. اختلال در سامانه گوارشی حشرات تأثیر منفی بر نشو و نما حشرات دارد. هضم و جذب مواد غذایی دچار اختلال شده و به دلیل عدم دریافت مواد غذایی کافی حشرات دچار سوء هاضمه و مشکلات نشو و نمایی می‌شوند. مطالعات متعددی مؤید این موضوع است (Senthil-Nathan, 2006; Rajguru & Sharma, 2012; Abedi et al., et al., 2006; Khorrami & Soleymanzade, 2021). در یک مطالعه تأثیر تلفیق عصاره‌های گیاهی با *Bt* بر مرگ و میر و میزان نفوذ لاروهای بید سیب‌زمینی بررسی شد. نتایج نشان داد که تلفیق این عوامل هر چند اثرات سینرژیستی در مقایسه با کاربرد عوامل به صورت انفرادی نداشت ولی اثرات جمعیتی خوبی داشته و پیشنهاد شده است که استفاده از تلفیق این عوامل ضمن نتیجه مطلوب موجب کاهش احتمال بروز افراد مقاوم در جمعیت بید سیب‌زمینی شده و مصرف سموم شیمیایی را کاهش خواهد داد (Fouad Sharaby et al., 2019). در یک بررسی دیگر اثرات تلفیق غلظت‌های زیرکشنده باکتری *Bt* و NPV بر *S. littoralis* مورد بررسی قرار گرفت (Magholi Fard et al., 2020). نتایج نشان داد که طول دوره لاروی در این حشره افزایش معنی‌داری دارد، و درصد تبدیل شدن به شفیره و حشره کامل کاهش یافت. همچنین در این بررسی مشخص شد که غلظت‌های زیرکشنده *Bt* می‌تواند طول دوره رشدی لاروهای حشره مورد بررسی را افزایش دهد. نتایج این تحقیقات با مشاهدات تحقیق حاضر همخوانی دارد و اثرات زیستی که منجر به کاهش معنی‌داری در ظهور حشرات کامل شد از نتایج قابل توجه پژوهش حاضر می‌باشد.

افزایش اثرات سینرژیستی با افزایش زمان در معرض قرارگیری نیز در تحقیق حاضر مشاهده شد و پس از ۱۴۴ ساعت بیشترین میزان اثرات در تلفیق‌های بیشتری در مقایسه با ۴۸ ساعت اول ثبت گردید. در بررسی تأثیر تلفیق عصاره‌های گیاهان مختلف با *Bt* علیه کرم برگ‌خوار پنبه، *S. litura*، نتیجه مشابهی گزارش گردید و با افزایش زمان در معرض قرارگیری، مرگ و میر به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (Rajguru & Sharma, 2012). در تحقیق دیگری تلفیق عصاره آبی چند گیاه در تلفیق با *Bt* علیه *Anticarsia gemmatalis* (Lepidoptera: Erebiniae) بررسی و مشاهده گردید عصاره برخی گیاهان در تلفیق با *Bt*، با گذشت زمان تا ۷۲ ساعت اثر سینرژیستی بر مرگ و میر لاروها داشتند و ترکیباتی نیز اثرات آنتاگونیستی داشته و مرگ و میر کاهش یافته است (Vilani et al., 2017). نتایج این تحقیق نیز از نظر نتایج حاصله با تحقیق حاضر همخوانی دارد.

آزمایشگاه فیتوشیمی گروه شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای
در اختیار گذاشتن امکانات لازم برای عصاره‌گیری و آنالیز داده‌ها

تقدیر و تشکر می‌شود.

References

1. Abedi, Z., Saber, M., Vojoudi, S., Mahdavi, V., & Parsaeyan, E. (2014). Acute, sublethal, and combination effects of azadirachtin and *Bacillus thuringiensis* on the cotton bollworm, *Helicoverpa armigera*. *Journal of Insect Science*, 14, 30. <https://doi.org/10.1093/jis/14.1.30>
2. Aghaali, N., Ghadamyari, M., Hosseinaveh, V., & Saberi Riseh, N. (2013). Protease inhibitor from the crude extract of plant seeds affects the digestive proteases in *Hyphantria cunea* (Lep.: Arctiidae). *Journal of Plant Protection Research*, 53(4), 338-346. <https://doi.org/10.2478/jppr-2013-0051>
3. Ali, K., Sagheer, M., ul Hasan, M., Rashid, A. & Shahid, M. (2021). Bioactivity of medicinal plant extracts as toxicants and enzyme inhibitors against insect pests of stored commodities. *Journal of Crop Protection*, 10(1), 95-109. <https://doi.org/10.1001.1.22519041.2021.10.1.11.5>
4. Allahverdizadeh, N.M., & Mohammadi, D. (2016). Bioactivity of *Marrubium vulgare* and *Achillea millefolium* leaf extracts on potato tuber moth *Phthorimaea operculella* Zeller. *Munis Entomology and Zoology*, 11(1), 114-122.
5. Alvarez, J.M., Dotseth, E., & Nolte, P. (2005). *Potato tuber worm: a threat for Idaho potatoes*. University of Idaho Experiment Station Bulletin, CIS1125 1-4.
6. Alves, T.J.S., Cruz, G.S., Wanderley-Teixeira, V., Teixeira, A.A.C., Oliveira, J.V., Correia, A.A., Câmara, A.A.G., & Cunha, F.M. (2013). Effects of *Piper hispidinervum* on spermatogenesis and histochemistry of ovarioles of *Spodoptera frugiperda*. *Biotechnic and Histochemistry*, 88, 1-11. <https://doi.org/10.3109/10520295.2013.837509>
7. Bernfeld, P. (1955) Amylase α and β . *Methods in Enzymology*, 1, 149-158. [https://doi.org/10.1016/0076-6879\(55\)01021-5](https://doi.org/10.1016/0076-6879(55)01021-5)
8. Candido, L.P., Cavalcanti, M.T., & Beserra, E.B. (2013). Bioactivity of plant extracts on the larval and pupal stages of *Aedes aegypti* (Diptera, Culicidae). *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, 46(4), 420-425. <https://doi.org/10.1590/0037-8682-0118-2013>
9. Capinera, J.L. (2020). *Handbook of vegetable pests*. Academic Press, New York.
10. Da Lage, J-L. (2018). The amylases of insects. *International Journal of Insect Science*, 10, 1-14. <https://doi.org/10.1177/1179543318804783>
11. de França, S.M., Breda, M.O., Barbosa, D.R.S., Araujo, A.M.N., & Guedes, C.A. (2017). The sublethal effects of insecticides in insects. In: Shields, V.D.C. (Ed.), *Biological Control of Pest and Vector Insects*, Intech Open. <https://doi.org/10.5772/66461>
12. Dekebo, A., Aryal, S., & Jung, C. (2019). Olfactory responses of adult potato tuber moth, *Phthorimaea operculella* (Zeller) measured by attraction relative to the tomato leaf volatiles. *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 22, 611-618. <https://doi.org/10.1016/j.aspen.2019.04.007>
13. Dirar, A.I., Alsaadi, D.H.M., Wada, M., Mohamed, M.A., Watanabe, T., & Devkota, H.P. (2019). Effects of extraction solvents on total phenolic and flavonoid contents and biological activities of extracts from Sudanese medicinal plants. *South African Journal of Botany*, 120, 261-267. <https://doi.org/10.3390/agriculture12111820>
14. Dogramaci, M., & Tingey, W. (2008). Comparison of insecticide resistance in a North American field population and a laboratory colony of potato tuber worm (Lepidoptera: Gelechiidae). *Journal of Pest Science*, 81, 17-22. <https://doi.org/10.1007/s10340-007-0178-5>
15. Dolores Ibáñez, M., Sanchez-Ballester, N.M., & Amparo Blázquez, M. (2020). Encapsulated limonene: a pleasant lemon-like aroma with promising application in the agri-food industry. A review. *Molecules*, 25, 1-20. <https://doi.org/10.3390/molecules25112598>
16. El-kady, H. (2011). Insecticide resistance in potato tuber moth *Phthorimaea Operculella* Zeller in Egypt. *Journal of American Science*, 7(10), 263-266.
17. El-Wakeil, N.E. (2013). Botanical pesticides and their mode of action. *Gesunde Pflanzen*, 65, 125-149. <https://doi.org/10.1007/s10343-013-0308-3>
18. Fouad Sharaby, A.M., Gesraha, M.A., & Baker Fallatah, S.A. (2019). Integration of some biopesticides against potato tuber moth, *Phthorimaea operculella* (Zell.), during storage with reference to histopathological changes detected by a transmission electron microscope in the endocrine system. *Bulletin of the National Research Centre*, 43, 1-16. <https://doi.org/10.1186/s42269-019-0163-1>
19. Gujar, G.T., Kalia, V., Kumari, A., & Prasad, T.V. (2004). Potentiation of insecticidal activity of *Bacillus thuringiensis* subsp. kurstaki HD-1 by proteinase inhibitors in the American bollworm, *Helicoverpa armigera* (Hübner). *Indian Journal of Experimental Biology*, 42, 157-163.
20. Handa, S.S., Singh Khanuja, S.P., Longo, G., & Rakesh, D.D. (2008). *Extraction technologies for medicinal and aromatic plants*. International center for science and high technology, 260 P.

21. Hatami, A., Mohammadi, D., & Eivazian Kary, N. (2022). Comparing oral toxicity of *Apium graveolens* and *Falcaria vulgaris* extracts with Bt against *Phthorimaea operculella* (Zeller). *Journal of Applied Research in Plant Protection*, 11(3), 17-29. (In Persian with English abstract). <https://doi.org/10.22034/ARPP.2022.15186>
22. Hussain Shah, T. (2017). Plant nutrients and insect's development. *International Journal of Entomology Research*, 2(6), 54-57.
23. Ibrahim, M.A., Kainulainen, P., Aflatuni, A., Tiilikata, K., & Holopainen, J.K. (2001). Insecticidal, repellent, antimicrobial activity and phytotoxicity of essential oils: With special reference to limonene and its suitability for control of insect pests. *Agricultural and Food Science in Finland*, 10, 243-259. <https://doi.org/10.23986/afsci.5697>
24. Isman, M.B. (2020). Botanical insecticides in the twenty-first century—fulfilling their promise? *Annual Review Entomology*, 65, 233–249. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-011019-025010>
25. Jung, J-M., Lee, S-G., Kim, K.H., Jeon, S.W., Jung, S., & Lee, W.H. (2019). The potential distribution of the potato tuber moth (*Phthorimaea Operculella*) based on climate and host availability of potato. *Agronomy*, 10, 12. <https://doi.org/10.3390/agronomy10010012>
26. Karr, L.L., & Coats, J.R. (1988). Insecticidal properties of d-limonene. *Journal of Pesticide Science*, 13, 2287–2290. <https://doi.org/10.1584/jpestics.13.287>
27. Khalil, A., Nawaz, H., Ghania, JB., Rehman, R., & Nadeem, F. (2015). Value added products, chemical constituents and medicinal uses of celery (*Apium graveolens* L.) – a review. *International Journal of Chemical and Biochemical Sciences*, 8, 40-48.
28. Khan, S., Nazir Uddin, M., Rizwan, M., Khan, W., Farooq, M., Shah, A., Subhan, F., Aziz, F., Ur Rahman, K., Khan, A., Ali, S., & Muhammad, M. (2020). Mechanism of insecticide resistance in insects/pests. *Polish Journal of Environmental Studies*, 29(3), 2023–2030. <https://doi.org/10.15244/pjoes/108513>
29. Khorrami, F., & Soleymanzade, A. (2021). Efficacy of some chemical insecticides and plant extracts combined with *Bacillus thuringiensis* against *Phthorimaea operculella*. *Acta phytopathologica et entomologica Hungarica*, 56(2), 169-179. <https://doi.org/10.1556/038.2021.00119>
30. Konecka, E., Kaznowski, A., Grzesiek, W., Nowicki, P., Czarniewska, E., & Baranek, J. (2020). Synergistic interaction between carvacrol and *Bacillus thuringiensis* crystalline proteins against *Cydia pomonella* and *Spodoptera exigua*. *BioControl*, 65, 447–460. <https://doi.org/10.1007/s10526-020-10011-4>
31. Kooti, W., Ali-Akbari, S., Asadi-Samani, M., Ghadery, H., & Ashtary-Larky, D. (2014). A review on medicinal plant of *Apium graveolens*. *Advanced Herbal Medicine*, 1(1), 48-59.
32. Koppenhöfer, A.M., & Kaya, H.K. (1997). Synergism of imidacloprid and an entomopathogenic nematode: a novel approach to white grub (Coleoptera: Scarabaeidae) control in turfgrass. *Journal of Economic Entomology*, 91, 618–623. <https://doi.org/10.1093/jee/91.3.618>
33. Koul, O., Walia, S., & Dhliwal, G. (2008). Essential oils as green pesticides: potential and constraints. *Biopesticides International*, 4(1), 63-84.
34. Kuppusamy, P., Yusoff, M.M., Maniam, G.P., & Govindan, N., (2016). Biosynthesis of metallic nanoparticles using plant derivatives and their new avenues in pharmacological applications - An updated report. *Saudi Pharmaceutical Journal*, 24(4), 473-84. <https://doi.org/10.1016/j.jsps.2014.11.013>
35. Le, A.V., Parks, S.E., Nguyen, M.H., & Roach, P.D. (2018). Effect of solvents and extraction methods on recovery of bioactive compounds from defatted gac (*Momordica cochinchinensis* Spreng.) seeds. *Separations*, 5, 39. <https://doi.org/10.3390/separations5030039>
36. Lee, C.Y. (2000). Sublethal effects of insecticide on longevity, fecundity, and behavior of insect pests: a review. *Bioscience Journal*, 11, 107–112. <https://doi.org/10.5772/66461>
37. Lezoul, N.H., Belkadi, M., Habibi, F., & Guillén, F. (2020). Extraction processes with several solvents on total bioactive compounds in different organs of three medicinal plants. *Molecules*, 25, 4672. <https://doi.org/10.3390/molecules25204672>
38. Madasamy, M., Sahayaraj, K., Sayed, S.M., Al-Shuraym, L.A., Selvaraj, P., El-Arnaouty, S.A. & Madasamy, K. (2023). Insecticidal mechanism of botanical crude extracts and their silver nanoliquids on *Phenacoccus solenopsis*. *Toxics*, 11, 305. <https://doi.org/10.3390/toxics11040305>
39. Magholi Fard, Z., Hesami, S., Marzban, R., & Salehi Jouzani, G. (2020). Individual and combined biological effects of *Bacillus thuringiensis* and multicapsid Nucleopolyhedrovirus on the biological stages of egyptian cotton leafworm, *Spodoptera littoralis* (B.) (Lep.: Noctuidae). *Journal of Agricultural Science Technology*, 22(2), 465-476. <https://doi.org/10.1001.1.16807073.2020.22.2.13.1>
40. Malik, K., & Riasat, R. (2014). Study of combined effect of locally isolated *Bacillus thuringiensis* and turmeric powder on red flour beetle (*Tribolium castaneum*). *International Journal of Current Microbiology Applied Science*, 3, 760–77. <https://doi.org/10.5829/idosi.aje.2015.8.1.9244>
41. Mehrabadi, M., Bandani, A.R., & Alizadeh, H. (2012). Inhibitory activity of proteinaceous alpha- amylase inhibitors from Triticale seeds against *Eurygaster integriceps* salivary alpha-amylases: Interaction of the inhibitors and the insect digestive enzymes. *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 102, 220-228. <https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2012.01.008>

42. Mesén-Porras, E., Dahdouh-Cabia, S., Jimenez-Quiros, c., Mora-Castro, R., Rodríguez, C., & Pinto-Tomás, A. (2020). Soybean protease inhibitors increase *Bacillus thuringiensis* subs. *Israelensis* toxicity against *Hypothenemus hampei*. *Agronomía Mesoamericana*, 31(2), 461-478. <https://doi.org/10.15517/am.v31i2.36573>
43. Mohammadi, D., Eivazian Kary, N., & Sharifi Azar, Z. (2020). Enhancing Efficiency of *Bacillus thuringiensis* by Leaf Extract of *Cupressus arizonica* against *Spodoptera exigua* (Lep.: Noctuidae). *Journal of Applied Research in Plant Protection*, 9(1), 89-105. (In Persian with English abstract)
44. Nazarpour, L., Yarahmadi, F., Saber, M., & Rajabpour, A. (2016). Short and long term effects of some bio-insecticides on *Tuta absoluta* Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) and its coexisting generalist predators in tomato fields. *Journal of Crop Protection*, 5(3), 331-342. <https://doi.org/20.1001.1.22519041.2016.5.3.7.0>
45. Ngegba, P.M., Cui, G., Khalid, M.Z., & Zhong, G. (2022). Use of botanical pesticides in agriculture as an alternative to synthetic pesticides. *Agriculture*, 12(5), 600. <https://doi.org/10.3390/agriculture12050600>
46. Nouri-Ganbalani, G., Borzoui, E., Abdolmaleki, A., Abedi, Z., & George Kamita, S. (2016). Individual and combined effects of *Bacillus thuringiensis* and *Azadirachtin* on *Plodia interpunctella* Hübner (Lepidoptera: Pyralidae). *Journal of Insect Science*, 16(1), 95. <https://doi.org/10.1093/jisesa/iew086>. PMID: 27638953
47. Opende, K., & Walia, S. (2009). *Comparing impacts of plant extracts and pure allelochemicals and implications for pest control*. Cab Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources 4, 1-30. <https://doi.org/10.1079/PAVSNRR20094049>
48. Plata-Rueda, A., Quintero, H.A., Serrão, J.E., & Martínez, L.C. (2020). Insecticidal activity of *Bacillus thuringiensis* strains on the nettle caterpillar, *Euprosterina elaeasa* (Lepidoptera: Limacodidae). *Insects*, 11, 310. <https://doi.org/10.3390/insects11050310>
49. Qi, X.-J., Feng, Y.X., Pang, X., & Du, S.S. (2021). Insecticidal and repellent activities of essential oils from seed and root of celery (*Apium graveolens* L.) against three stored product insects. *Journal of Essential Oil Bearing Plants*, 24(5), 1169-1179. <https://doi.org/10.1080/0972060X.2021.1981159>
50. Rajguru, M., & Sharma, A.N. (2012). Comparative efficacy of plant extracts alone and in combination with *Bacillus thuringiensis* sub sp. *kurstaki* against *Spodoptera litura* Fab. larvae. *Journal of Biopesticides*, 5(1), 81-86.
51. Rajguru, M., Sharma, A., & Banerjee, S. (2011). Assessment of plant extracts fortified with *Bacillus thuringiensis* (Bacillales: Bacillaceae) for management of *Spodoptera litura* (Lepidoptera: Noctuidae). *International Journal of Tropical Insect Science*, 31(1-2), 92-97. <https://doi.org/10.1017/S174275841100018X>
52. Reddy, D.S., & Chowdary, N.M. (2021). Botanical biopesticide combination concept- a viable option for pest management in organic farming. *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 31, 1-10. <https://doi.org/10.1186/s41938-021-00366-w>
53. Rondon, S.I. (2010). The potato tuberworm: a literature review of its biology, ecology, and control. *American Journal of Potato Research*, 87, 149-166. <https://doi.org/10.1007/s12230-009-9123-x>
54. Rożek, E., Nurzyńska-Wierdak, R., Sałata, A., & Gumiela P. (2016). The chemical composition of the essential oil of leaf celery (*Apium graveolens* L. var. *Secalinum* Alef.) under the plants' irrigation and harvesting method. *Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus*, 15(1), 147-157.
55. Sánchez-Yáñez, J.M., Rico, J.L., & Ulbarri, G. (2022). *Bacillus thuringiensis* (Bt) is more than a special agent for biological control of pests. *Journal of Applied Biotechnology and Bioengineering*, 9(2), 33-39. <https://doi.org/10.15406/jabb.2022.09.00282>
56. Schoor, T.V., Kelly, E.T., Tam, N., & Michael Attardo, G. (2020). Impacts of dietary nutritional composition on larval development and adult body composition in the yellow fever mosquito (*Aedes aegypti*). *Insects*, 11, 535. <https://doi.org/10.3390/insects11080535>
57. Senthil-Nathan, S., Kandaswamy, K., Kim, S., & Kadarkarai, M. (2006). The toxicity and behavioural effects of neem limonoids on *Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) the rice leaf-folder. *Chemosphere*, 62, 1381-7. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2005.07.051>
58. Silva, C.T.S., Wanderley-Teixeira, V., Cunha, F.M., Oliveira, J.V., Dutra, K.A., Navarro, D.M.A.F., & Teixeira, A.A.C. (2016). Biochemical parameters of *Spodoptera frugiperda* treated with citronella oil (*Cymbopogon winterianus* Jowitt ex Bor) and its influence on reproduction. *Acta Histochemistry*, 118, 347-352. <https://doi.org/10.1016/j.acthis.2016.03.004>
59. Singh Rattan, R. (2010). Mechanism of action of insecticidal secondary metabolites of plant origin. *Crop Protection*, 29(9), 913-920. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2010.05.008>
60. Stark, J.D., & Banks, J.E. (2003). Population-level effects of pesticides and other toxicants on arthropods. *Annual Review of Entomology*, 48, 505-519. <https://doi.org/10.1146/annurev.ento.48.091801.112621>
61. Sun, J., Feng, Y., Wang, Y., Li, J., Zou, K., Liu, H., Hu, Y., Xue, Y., Yang, L., Shushan, Du, S., & Wu, Y. (2020). Investigation of pesticidal effects of *Peucedanum terebinthinaceum* essential oil on three stored-product insects. *Records of Natural Products*, 14(3), 177-189.
62. Talaie-Hassanloui, R., Bakhshaei, R., Hosseininaveh, V., & Khorramnezhad, A. (2014). Effect of midgut proteolytic activity on susceptibility of lepidopteran larvae to *Bacillus thuringiensis* subsp. *Kurstaki*. *Frontiers in Physiology*, 4, 406. <https://doi.org/10.3389/fphys.2013.00406>

63. Theochari, I., Giatropoulos, A., Papadimitriou, V., Karras, V., Balatsos, G., Papachristos, D., & Michaelakis, A. (2020). Physicochemical characteristics of four limonene-based nanoemulsions and their larvicidal properties against two mosquito species, *Aedes albopictus* and *Culex pipiens molestus*. *Insects*, *11*, 1-12. <https://doi.org/10.3390/insects11110740>
64. Vilani, A., Lozano, E.R., Potrich, M., Angeli, A., Luis, F., Martins, C.M.F., Dall Agnol de Lima, J., & de Gouvea, A. (2017). Activity of plant aqueous extracts on *Bacillus thuringiensis* and their interactions on *Anticarsia gemmatalis* (Lepidoptera: Erebiniae). *Semina: Ciências Agrárias*, *38*(2), 1051-1057. <https://doi.org/10.5433/1679-0359.2017v38n2p1051>
65. Visweshwar, R., Akbar, S.M.D., Sharma, H.C., & Sreeramulu, K. (2018). Influence of *Bacillus thuringiensis* toxins on the development and midgut proteases in different larval instars of *Helicoverpa armigera*. *Indian Journal of Entomology*, *80*(3), 960-970.
66. Yang, J., Quan, Y., Sivaprasath, P., Shabbir, M.Z., Wang, Z., Ferré, J., & He, K. (2018). Insecticidal activity and synergistic combinations of ten different Bt toxins against *Mythimna separata* (Walker). *Toxins*, (Basel), *4*;10(11): 454. <https://doi.org/10.3390/toxins10110454>
67. Yazdani, E., JalaliSendia, J., Zibaeaa, A., & Ghadamyari, M. (2010). Enzymatic properties of α -amylase in the midgut and the salivary glands of mulberry moth, *Glyphodes pyloalis* Walker (Lepidoptera: Pyralidae). *Comptes Rendus Biologies*, *333*(1), 17-22.
68. Yildirim, E., Emsen, B., & Kordali, S. (2013). Insecticidal effects of monoterpenes on *Sitophilus zeamais* Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae). *Journal of Applied Botany and Food Quality*, *86*, 198-204.
69. Zhang, C., Yu, J., Tu, Q., Yan, F., Hu, Z., Zhang, Y., & Song, C. (2022). Antioxidant capacities and enzymatic inhibitory effects of different solvent fractions and major flavones from celery seeds produced in different geographic areas in China. *Antioxidants*, *11*, 1542. <https://doi.org/10.3390/antiox11081542>
70. Zhu, F., Lavine, L., O'Neal, S., Lavine, M., Foss, C., & Walsh, D. (2016). Insecticide resistance and management strategies in urban ecosystems. *Insects*, *7*, 2. <https://doi.org/10.3390/insects7010002>