

Evaluation of the Residue Levels of New Fungicides Dagonis® and Affiance® in the Control of Tomato Early Blight Disease

Mohsen Morowati^{1*}, Kasra Sharifi², Vahide Mahdavi¹

1- Pesticides Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran.

2- Plant Diseases Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran.

(* - Corresponding author's Email: M_Morovati@areeo.ac.ir, M_Morowati@yahoo.com)

How to cite this article:

Received: 24-06-2024

Revised: 15-09-2024

Accepted: 25-11-2024

Available Online: 09-07-2025

Morowati, M., Sharifi, K., & Mahdavi, V. (2025). Evaluation of the residue levels of new fungicides Dagonis® and Affiance® in the control of tomato early blight disease. *Iranian Plant Protection Research*, 39(2), 169-180. (In Persian with English abstract)

<https://doi.org/10.22067/jpp.2024.88636.1196>

Introduction

Tomato early blight is an important disease in tomato which is caused by *Alternaria alternata*, *A. tenuissima* and *A. solani* species, and occurs in a wide range of weather conditions all around the world. For the chemical control of this disease, the fungicides Dagonis® 12.5% SC (fluxapyroxad 75 g L⁻¹ + difenoconazole 50 g L⁻¹) at a rate of 1200 mL ha⁻¹, Affiance® 17% SC (tetraconazole 75 g L⁻¹ + azoxystrobin 95 g L⁻¹) at a rate of 600 mL ha⁻¹ and Signum® (boscalid 252 g L⁻¹ + pyraclostrobin 128 g L⁻¹) at rate of 500 g ha⁻¹ were used. In order to evaluate residue levels of these fungicides, experiments were carried out under greenhouse conditions in Alborz province during the years 2020 to 2022.

Materials and Methods

In order to investigate the effect of Affiance®, Dagonis® and Signum® fungicides in controlling tomato early blight disease, experiments with 3 treatments and four replications were conducted in Alborz province under greenhouse conditions in the form of a completely randomized design. Control was considered without any spraying of these fungicides.

In order to measure the residue levels of these fungicides in the treated tomato fruits, samples were collected at 1, 2, 3, 4 and 5 days after spraying according to the Iran's national standard method no. 8366/2005 entitled "Pesticides- Determination of pesticide residues in crops and livestock- sampling method". Extraction of pesticides were carried out by Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe (QuEChERS) method and pesticide residue levels were measured by Liquid Chromatography Mass/Mass (LC-MS/MS) and the values were compared with the national and international Maximum Residue Limits (MRLs). For preparation and extraction, tomato samples were crushed and homogenized and 15 grams of the homogenized and crushed sample was weighed as a laboratory test sample. By adding 15 mL of acetonitrile containing 1% acetic acid, the overall extraction process was performed. Anhydrous magnesium sulfate, sodium chloride and sodium acetate



©2025 The author(s). This is an open access article distributed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

<https://doi.org/10.22067/jpp.2024.88636.1196>

adsorbents were used to complete the extraction process. By centrifugation, the organic phase was separated from the aqueous tissue and 5 ml of the organic phase obtained from this step was used for the cleanup step. For purification, magnesium sulfate adsorbents were used in order to remove excess water in the medium and PSA (Poly Secondary Amine) in order to remove large molecules, organic acids, proteins and other disturbing co-extractives. Finally, after centrifugation, 1 mL of the resulting organic phase was prepared after filtration for evaporation and then injection into the LC-MS/MS.

Calibration of LC-MS/MS

First, by directly injecting the standard solution ($1 \mu\text{g mL}^{-1}$) of each of the pesticides alone to the MS detector, the fragmentation voltage of the parent ion (Precursor Ion) and the collision energy for each of the daughter ions (Daughter Ion) or product ions of each compound were optimized. In other words, at this stage, the best conditions for high-sensitivity detection were determined for each of the compounds.

Validation of the Method

According to the Sanco standard, three concentration levels were validated, which were made in acetonitrile solvent and tomato matrix. For this purpose, by diluting the mother solution appropriately, solutions were prepared at three different concentration levels of 0.05, 0.1, and 0.2 mg kg^{-1} of the mixture of the standards of pesticides under investigation in solvent and tomato matrix. Regarding the linear dynamic range (LDR) for all pesticides the beginning of the range is the same as the limit of quantitation (LOQ). The figures of acceptable merit and recovery in the range of 80.1 to 111% with RSD from 10 to 14.5% indicate the acceptability of the proposed analysis method.

Results and Discussion

The results obtained for the residue levels of Dagonis[®] fungicide consisting of fluxapyroxad and difenoconazole, showed that according to the MRL of fluxapyroxad ($\text{MRL} = 0.2 \text{ mg kg}^{-1}$), two days after spraying it was less than the MRL and difenoconazole residue levels was less than the MRL ($\text{MRL} = 0.6 \text{ mg kg}^{-1}$) one day after spraying. The amount of residue in Affiance[®] treatment samples, consisting of two fungicides, tetraconazole and azoxystrobin, showed that after 3 days of spraying, the residue of tetraconazole reached the MRL (0.1 mg kg^{-1}) and the residue of the fungicide azoxystrobin was lower than the MRL (3 mg kg^{-1}) one day after spraying. The results of the pesticide residue measured in the samples treated with Signum[®] consisting of boscalid and pyraclostrobin showed that the pyraclostrobin residue levels were lower than the MRL (1 mg kg^{-1}) two days after spraying this fungicide, and boscalid residue was lower than the MRL (3 mg kg^{-1}) after one day of spraying. In the control samples, the tested fungicides were not detectable.

Conclusions

Therefore, Affiance[®], Dagonis[®] and Signum[®] fungicides at the rates of 600, 1200 mL and 500 g ha^{-1} , with the pre-harvest intervals of 3, 2 and 2 days respectively, are safe considering the residue levels of them and are recommended to be used to control early blight disease in tomato.

Keywords: Alternaria, Chemical control, Food safety, Maximum Residue Limits, Pre-Harvest interval

ارزیابی مقدار باقی مانده قارچ‌کش‌های جدید داگونیس® و آفیانس® در مهار بیماری لکه موجی گوجه‌فرنگی

محسن مروتی^{۱*}، کسری شریفی^۲، وحیده مهدوی^۱

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵

چکیده

بیماری لکه‌موجی یکی از بیماری‌های مهم گوجه‌فرنگی محسوب می‌شود که عوامل آن قارچ‌های *A. tenuissima* و *A. alternata* می‌باشند و در شرایط آب‌وهوایی گرم و مرطوب، نیمه‌مرطوب و معتدل ایجاد می‌شود. برای مهار شیمیایی این بیماری، از قارچ‌کش‌های داگونیس® SC 12.5% (فلوکسپیروکساید ۷۵ گرم بر لیتر + دیفنوکانازول ۵۰ گرم بر لیتر)، آفیانس® SC 17% (تتراکونازول ۷۵ گرم بر لیتر + آزوکسی‌استروبین ۹۵ گرم بر لیتر) و سیگنوم® (بوسکالید ۲۵۲ گرم بر لیتر + پیراکلواستروبین ۱۲۸ گرم بر لیتر) به‌ترتیب با مقادیر ۱۲۰۰ میلی‌لیتر، ۶۰۰ میلی‌لیتر و ۵۰۰ گرم در هکتار استفاده می‌شود. به‌منظور بررسی میزان باقی‌مانده این قارچ‌کش‌ها پس از محلول‌پاشی با قارچ‌کش‌های مذکور برای مهار بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی، آزمایشات در شرایط گلخانه‌ای واقع در استان البرز روی رقم SV4129 صورت گرفت. نمونه‌برداری از میوه‌ها در زمان‌های یک، دو، سه، چهار و پنج روز پس از محلول‌پاشی انجام شد. استخراج قارچ‌کش‌ها طبق روش‌های استاندارد ملی ایران صورت گرفت. اندازه‌گیری باقی‌مانده آن‌ها با دستگاه کروماتوگرافی مایع مجهز به تجزیه‌گر متوالی جرمی انجام و مقادیر محاسبه شده با مرز بیشینه مانده مجاز ملی و بین‌المللی مقایسه گردید. نتایج به‌دست آمده در مورد قارچ‌کش داگونیس®، نشانگر کاهش میزان باقی‌مانده آن به کمتر از مرز بیشینه مانده مجاز، دو روز پس از سم‌پاشی بود. میزان باقی‌مانده در نمونه‌های تیمار آفیانس®، نشان داد که باقی‌مانده آن پس از گذشت سه روز بعد از سم‌پاشی به‌مقدار برابر با مرز بیشینه مانده مجاز می‌رسد. بررسی باقی‌مانده سیگنوم® مشخص کرد که باقی‌مانده آن دو روز پس از سم‌پاشی به پایین‌تر از مرز بیشینه مانده مجاز می‌رسد. به این ترتیب، قارچ‌کش‌های آفیانس®، داگونیس® و سیگنوم® به‌ترتیب با مقادیر ۶۰۰ و ۱۲۰۰ میلی‌لیتر و ۵۰۰ گرم در هکتار با دوره‌های کارنس به‌ترتیب سه، دو و دو روز با توجه به‌میزان باقی‌مانده قارچ‌کش‌ها ایمن بوده و قابل توصیه برای مهار بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی هستند.

واژه‌های کلیدی: آلترناریا، دوره کارنس، سلامت غذا، مهار شیمیایی، مرز بیشینه مانده مجاز

مقدمه

فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در فضای باز و گلخانه به‌ترتیب حدود ۸۰ هزار و ۷۰۰ هکتار و تولید آن در ایران به‌ترتیب حدود ۳،۸۰۰،۰۰۰ و ۴۰۰،۰۰۰ تن در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برآورد شده است (Anonymous, 2022).

بیماری لکه‌موجی^۳ گوجه‌فرنگی که عوامل آن قارچ‌های *Alternaria solani* و *A. tenuissima* می‌باشند از بیماری‌های مهم گوجه‌فرنگی است که در شرایط آب‌وهوایی گرم و مرطوب، نیمه‌مرطوب و معتدل حادث می‌شود (Stammler et al.,

گوجه‌فرنگی (*Solanum lycopersicum* L.) از گیاهان مهمی است که میوه آن به‌صورت تازه‌خوری و همچنین در صنایع غذایی استفاده می‌شود (Bai & Lindhout, 2007). بنابه گزارش مرکز

۱- بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

۲- بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهی، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

(*)- نویسنده مسئول: (Email: M_Morowati@yahoo.com)

<https://doi.org/10.22067/jpp.2024.88636.1196>

جلوگیری می‌کند^۳ و محل اثر آن C14-دمتیلاز در زیست‌ساخت^۴ استرول مربوط به پروتئین (Erg11) CYP51^۵ می‌باشد (Rosenzweig et al., 2019). آزوکسی استروبین از بازدارنده‌های خارجی کوئینون‌ها^۶ است و از طریق تأثیر بر زنجیره تنفس میتوکندریایی نقش بازدارندگی در جوانه‌زنی اسپور و رشد میسلیم دارد (Anonymous, 2022). آزوکسی استروبین ممکن است برخی از ریزموجودات مفید را که آنتاگونیست بیمارگرها هستند را از بین ببرد (Macar, 2022). همچنین دارای ریسک بالا به بروز مقاومت معرفی شده است (Fishel & Dewdney, 2012).

قارچ کش داگونیس^۷ SC 12.5% از دو جزء فلوکسپایروکساد^۸ (۷۵ گرم در لیتر) و دیفنوکونازول^۹ (۵۰ گرم در لیتر) تشکیل شده است. دیفنوکونازول از بازدارنده‌های دمتیلاسیون محسوب می‌شود و خطر مقاومت نسبت به آن در قارچ‌های بیمارگر متوسط است (Anonymous, 2022). قارچ کش مذکور به‌صورت سیستمیک و محافظتی عمل نموده و دارای دامنه وسیع با خاصیت پیشگیری و معالجه‌کنندگی می‌باشد. دیفنوکونازول دارای طیف وسیع قارچ‌کشی بوده و به‌صورت محلول‌پاشی روی اندام‌های هوایی و یا به‌صورت ضدعفونی بذر برای مهار بیماری‌های بذرزاد و حفاظت از بذر در مقابل تهاجم قارچ‌ها استفاده می‌شود (Fishel & Dewdney, 2012). دیگر ماده مؤثره داگونیس، فلوکسپایروکساد یک مهارکننده سوکسینات دهیدروژناز^{۱۰} (SDHI) است. این ماده در برخی از مراحل مهم چرخه زندگی قارچ از جمله جوانه‌زنی اسپور، رشد لوله جوانه‌زنی، تشکیل آپرسوریا و رشد میسلیم دخالت کرده و با مهار آنزیم سوکسینات دهیدروژناز مانع از رشد قارچ می‌شود (Strathmann et al., 2011).

قارچ کش سیگنوم^{۱۱} از جمله قارچ‌کش‌های جدید متشکل از دو ماده مؤثر بوسکالید^{۱۲} و پیراکلوآسترین^{۱۳} به‌ترتیب از گروه قارچ‌کش‌های آنیلید^{۱۴} و استروبیلورین^{۱۵} است که ضمن محافظت، موجب مهار تکثیر عامل بیماری در گیاه می‌گردد. نحوه اثر پیراکلوآسترین از طریق ممانعت از تنفس میتوکندریایی و نحوه اثر کاربوکسامید از طریق ممانعت از تشکیل آنزیم میتوکندریال سوکسینات‌دهیدروژناز می‌باشد. این قارچ کش به‌عنوان پیشگیری‌کننده

(2014). اگر اقدامات لازم برای مهار آن انجام نشود، شاخسار و اندام‌های سبز گیاه را تخریب و خسارت زیادی را به محصول وارد می‌کند. بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی از اکثر مناطق کشت گوجه‌فرنگی کشور گزارش شده است (Ershad, 1998). این بیماری در دنیا به‌خصوص در مناطق گرم و مرطوب و نیمه مرطوب با تشکیل شبنم‌های صبحگاهی، آلودگی ایجاد می‌کند. میانگین خسارت ناشی از این بیماری در دنیا حدود ۳۰ درصد برآورد شده است که اهمیت این بیماری را نشان می‌دهد (Chaerani et al., 2007; El-Tanany et al., 2018). عوامل بیماری در گوجه‌فرنگی، بادمجان (Solanum melongena L.) و سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) شیوع دارد و گونه‌های مختلفی به‌عنوان عوامل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی از جمله قارچ‌های *A. alternata*, *Alternaria solani* و *A. tenuissima* معرفی شده‌اند (Saleem & El-Shahir, 2022; Stammer et al., 2014). خسارت بیماری در ارقام گوجه‌فرنگی زودرس به‌خصوص در مناطق کشت در بندرعباس، میناب و جیرفت فوق‌العاده زیاد و مهم است (Ahmadinejad & Doodabi, 1986). میزان آلودگی در مناطق جیرفت و کهنوج حدوداً بین ۹۰-۶۰ درصد گزارش شده است (Jalilani, 1991). این بیماری در سال‌های اخیر باعث بروز خسارت قابل توجهی در مناطق جنوبی ایران شده است. علائم بیماری در میوه و برگ شبیه بوده و به‌صورت لکه‌های گرد تا بیضی و به‌رنگ قهوه‌ای با حلقه‌های متحدالمرکز تیره می‌باشند (Hansen, 2009). از آنجایی که بدون استفاده به‌هنگام از برنامه‌های زمان‌بندی شده سم‌پاشی با قارچ‌کش‌های مؤثر، امکان مهار بیماری وجود ندارد، به‌کارگیری قارچ‌کش‌های کم‌خطر و مؤثرتر برای پیش‌گیری از آلودگی و توسعه این بیماری از اهیت فراوانی برخوردار است (Hansen, 2009).

برای مهار بیماری لکه‌موجی اغلب از قارچ‌کش‌های شیمیایی استفاده می‌شود و در برخی از مناطق کشت گوجه‌فرنگی به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور به‌دلیل وجود رطوبت بالا و دمای معتدل به‌دلیل گسترش سریع آلودگی، سم‌پاشی به دفعات تکرار می‌شود. از جمله قارچ‌کش‌های مورد استفاده برای مهار بیماری لکه‌موجی می‌توان به پروپیکونازول، اپیرودیون + کاربندازیم، دیتیوکاربامات‌ها، کلروتالونیل، آزوکسی استروبین، پیراکسی استروبین و بیکربنات پتاسیم اشاره کرد (Dillard et al., 1995; Baimani et al., 2002).

قارچ کش آفانس^{۱۶} SC18% متشکل از ۸۰ گرم در لیتر تتراکونازول و ۱۰۰ گرم در لیتر آزوکسی استروبین است. تتراکونازول بازدارنده دمتیلاسیون^۲ بوده و از ساخت استرول‌های غشاء سلولی

- 3- Sterol demethylase inhibitors
- 4- Biosynthesis
- 5- Sterol 14 α -Demethylase
- 6- Quinone outside inhibitors (QoI)
- 7- Dagonis
- 8- Fluxapyroxad
- 9- Difenconazole
- 10- Succinate- dehydrogenase inhibitors
- 11- Boscalid
- 12- Pyraclostrobin
- 13- Anilide
- 14- Strobilurine

- 1- Affiance
- 2- Demethylation

پنج نمونه از تیمار سیگنوم با دوز ۵۰۰ گرم در هکتار، در زمان‌های یک، دو، سه، چهار و پنج روز پس از محلول‌پاشی و یک نمونه شاهد (بدون محلول‌پاشی) به مقدار یک کیلوگرم هر نمونه جمع‌آوری شد. پس از نمونه‌برداری، با زدن برچسب، داخل کیسه‌های پلی‌اتیلن تیره رنگ گذاشته شده و با حفظ دمای مناسب با قرار دادن نمونه‌ها در یخ، سریعاً به آزمایشگاه تعیین باقی‌مانده آفت‌کش‌های کشاورزی در بخش تحقیقات آفت‌کش‌های مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور منتقل شدند. نمونه‌برداری طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۸۳۶۶ سال ۱۳۸۴ با عنوان "آفت‌کش‌ها- تعیین باقی‌مانده در محصولات زراعی و دامی- روش‌های نمونه‌برداری" انجام شد. به‌منظور تکرارپذیری، آزمایش‌های اندازه‌گیری باقی‌مانده برای هر نمونه سه بار تکرار شد.

استخراج نمونه‌ها به‌منظور اندازه‌گیری باقی‌مانده آفت‌کش‌ها

جهت استخراج آفت‌کش‌های تحت آزمایش از روش کچرز^۵ طبق دستورالعمل ۲۰۰۸ اتحادیه اروپا (British Standard 2008) و استاندارد ملی ایران با عنوان "اندازه‌گیری باقی‌مانده آفت‌کش‌ها به‌روش کچرز" مصوب سال ۱۳۹۲ به شماره ۱۷۰۲۶ در نمونه‌های گوجه‌فرنگی استفاده شد. برای آماده‌سازی، نمونه‌های گوجه‌فرنگی خرد و همگن شدند. ۱۵ گرم از نمونه همگن و خرد شده به‌عنوان آزمایش از نمونه آزمایشگاهی توزین شد. با افزودن ۱۵ میلی‌لیتر استونیتریل^۶ حاوی یک درصد اسید استیک^۷ فرایند استخراج کلی انجام شد. برای تکمیل فرایند استخراج از جاذب‌های منیزیم سولفات بدون آب^۸، سدیم کلراید^۹ و سدیم استات^{۱۰} استفاده شد. با استفاده از سانتریفوژ، فاز آلی از بافت آبی جدا شد و پنج میلی‌لیتر فاز آلی به‌دست آمده از این مرحله برای مرحله تصفیه^{۱۱} استفاده گردید. برای تصفیه از جاذب‌های منیزیم سولفات به‌منظور حذف آب اضافی در محیط و پی‌اس‌ای^{۱۲} به‌منظور حذف مولکول‌های درشت، اسیدهای آلی، پروتئین‌ها و سایر هم‌استخراج‌های^{۱۳} غیر نیاز و مانع استفاده شد که در نهایت، پس از سانتریفوژ یک میلی‌لیتر از فاز آلی حاصل پس از عبور از فیلتر سرسرنگی برای تبخیر و سپس تزریق به دستگاه آماده شد (British Standard, 2008).

و درمان‌کننده عمل می‌نماید و بیماری‌های زنگ^۱، سفیدک پودری^۲، لکه برگ و بلایت^۳ را مهار می‌کند (Gentili et al., 2006).

مواد و روش‌ها

بررسی حاضر به‌منظور اندازه‌گیری میزان باقی‌مانده قارچ‌کش‌های آفیانس[®]، داگونیس[®] و سیگنوم[®] که برای مهار بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی در آزمایش‌های متفاوت در استان البرز در شرایط گلخانه طی سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مورد ارزیابی قرار گرفته بودند، صورت گرفت تا دوره کارنس این قارچ‌کش‌ها در گوجه‌فرنگی تعیین شود. برای این منظور، رقم گوجه‌فرنگی SV4129 در شرایط گلخانه هیدروپونیک در ایستگاه تحقیقات گیاهپزشکی کرج واقع در استان البرز کاشت شد. آزمایش‌ها در گلخانه با دمای ۲۲-۲۷ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵ ± ۷۰ درصد صورت گرفت.

برای تلقیح بیماری از روش محلول‌پاشی با ۱۰^۵ × ۱ اسپور زنده در هر میلی‌لیتر از زادمایه قارچ *A. solani* و با استفاده از آب‌پاش دستی در دو مرحله و با فاصله ۱۵ روز در مرحله میوه‌دهی گیاه استفاده شد. برای تکثیر قارچ از قطعات کوچکی از پرگنه ۱۰ روزه در تشتک‌های پتری حاوی محیط کشت سیب‌زمینی-هویج-آگار کشت داده و به‌مدت ۱۵ روز در دمای ۲۱ درجه سلسیوس نگهداری شد. برای تهیه زادمایه، حدود ۱۰ میلی‌لیتر آب مقطر سترون حاوی توئین ۲۰ (زیگما آلدریج) با غلظت نهایی ۰/۰۱ درصد به تشتک پتری حاوی پرگنه قارچ اضافه و سطح پرگنه با استفاده از اسکالپل به‌آرامی خراش داده شد. سپس با استفاده از لام هموسیستمتر^۴ محلول حاوی ۱×۱۰^۵ اسپور در میلی‌لیتر به‌مقدار کافی تهیه شد. بوته‌های گوجه‌فرنگی سالم و دارای ۸-۱۰ برگ مرکب با ارتفاع تقریباً یکسان انتخاب و با ۱۰ میلی‌لیتر از محلول حاوی اسپور از جدایه انتخابی محلول‌پاشی شد. شاهد با آب مقطر سترون محلول‌پاشی شد. برای استقرار عامل بیماری، بوته‌های تیمار شده به‌مدت ۴۸ ساعت در دمای ۲۳-۲۱ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی حدود ۸۰ درصد در شرایط گلخانه نگهداری شدند (Foolad et al., 2000). هم‌زمان با استقرار عامل بیماری، سم‌پاشی‌ها در سه نوبت با فاصله زمانی هفت روز انجام شد. شاهد بدون هیچ‌گونه سم‌پاشی بررسی گردید.

اندازه‌گیری باقی‌مانده آفت‌کش‌ها

تعداد ۱۶ نمونه میوه گوجه‌فرنگی (پنج نمونه از تیمار داگونیس با دوز ۱۲۰۰ میلی‌لیتر، پنج نمونه از تیمار آفیانس با دوز ۶۰۰ میلی‌لیتر و

5- QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe)

6- Acetonitrile

7- Acetic acid

8- Anhydrous magnesium sulfate

9- Sodium chloride

10- Sodium acetate

11- Clean up

12- PSA (poly secondary amine)

13- Co-extractive

1 Rust

2- Powdery mildew

3- Blight

4- Haematocytometer

جدول ۱- شرایط شویش استفاده شده در HPLC جهت استخراج قارچ‌کش‌های مورد مطالعه

Table 1- Washing conditions used in HPLC to extract the studied fungicides

Time (min)	% Mobile phase (water)	Flow (mL min ⁻¹)	Max. pressure (bar)
0.1	90	0.4	400
7	60	0.4	400
13	60	0.4	400
20	90	0.4	400

به این منظور، با رقیق‌سازی مناسب محلول مادر، محلول‌هایی در سه سطح غلظتی متفاوت با غلظت‌های ۰/۵، ۰/۱، ۰/۲، میلی گرم در کیلوگرم از مخلوط آفت‌کش‌های مورد مطالعه در حلال و ماتریس تهیه شد. در مورد محدوده دینامیک خطی^۸ برای همه آفت‌کش‌های موجود در جدول، ابتدای محدوده دینامیک خطی همان حد کمی^۹ است که در جدول ۳ نشان داده شده است. ارقام شایستگی قابل قبول و بازیابی در محدوده ۸۰/۱ تا ۱۱۱ درصد با انحراف استاندارد نسبی^{۱۰} از ۱۰ تا ۱۴/۵ درصد، نشان از قابل قبول بودن روش واکاوی پیشنهادی می‌باشد (Eslami et al., 2021; Mahdavi et al., 2022).

نتایج

نتایج به‌دست آمده از آزمایشات اندازه‌گیری باقی‌مانده قارچ‌کش‌های آفانوس[®]، داگونیس[®] و سیگنوم[®] در جداول ۴ تا ۶ آورده شده است. قارچ‌کش داگونیس[®] متشکل از دو جزء قارچ‌کش فلوکسپایروکساد و دیفنوکونازول می‌باشد، هر دو قارچ‌کش در نمونه میوه‌های گوجه‌فرنگی که در روزهای اول تا پنجم پس از سم‌پاشی جمع‌آوری شده بود، اندازه‌گیری شد. میانگین باقی‌مانده فلوکسپایروکساد در روز اول پس از محلول‌پاشی معادل ۱/۲۳ میلی گرم بر کیلوگرم اندازه‌گیری شد و با توجه به بیشینه مانده مجاز قارچ‌کش فلوکسپایروکساد که معادل ۰/۲ میلی گرم بر کیلوگرم می‌باشد، نمونه یک روز پس از سم‌پاشی بیش از حد مجاز باقی‌مانده دارد، اگر چه از روز دوم به بعد میزان باقی‌مانده این قارچ‌کش پایین‌تر از حد کمی دستگاه بوده و عملاً کمتر از بیشینه مانده مجاز این قارچ‌کش می‌باشد. حال اینکه قارچ‌کش دیفنوکونازول که دارای بیشینه مجاز ۰/۶ میلی گرم بر کیلوگرم می‌باشد، از یک روز بعد از سم‌پاشی با میانگین ۰/۴ میلی گرم بر کیلوگرم در نمونه‌ها به‌دست آمد که کمتر از بیشینه مجاز بوده و قابل مصرف می‌باشد. بنابراین

واکاوی و اندازه‌گیری آفت‌کش‌ها با دستگاه کروماتوگرافی

مایع مجهز به تجزیه‌گر متوالی جرمی^۱

شرایط شویش در کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا^۲ از شرکت Agilent مدل ۶۴۱۰ مجهز به آنالایزر triple quadrupole استفاده شد. جداسازی در LC مدل ۱۲۰۰ شرکت Agilent انجام شد. از ستون SB-C18, Zorbax Eclipse با مشخصات (۳/۰×۵۰/۰ mm) و ۱/۸ μm که در محفظه مجهز به ترموستات، در دمای ۲۵°C ثابت تنظیم شده بود، استفاده شد و برای جداسازی از فازهای متحرک، استونیتریل و آب حاوی ۰/۱٪ اسید فرمیک^۳ استفاده شد و شرایط شویش طبق جدول ۱ انجام گرفت.

کالیبره کردن دستگاه کروماتوگرافی مایع مجهز به

تجزیه‌گر متوالی جرمی با استانداردهای آفت‌کش‌های مورد مطالعه

ابتدا با تزریق مستقیم محلول استاندارد یک میکروگرم بر میلی‌لیتر هر یک از آفت‌کش‌ها به‌تنهایی به آشکارساز MS، ولتاژ قطعه قطعه شدن^۴ یون والد^۵ و انرژی برخورد برای هر یک از یون‌های دختر^۶ یا یون‌های تولیدی^۷ هر یک از ترکیبات بهینه شد. به عبارتی، در این مرحله بهترین شرایط برای تشخیص با حساسیت بالا برای هر یک از ترکیبات تعیین شد که اطلاعات شرایط بهینه در جدول ۲ نشان داده شده است.

اعتبارسنجی روش

طبق استاندارد سانکو، اعتبارسنجی در سه سطح غلظتی انجام گرفت که در حلال استونیتریل و ماتریس گوجه‌فرنگی ساخته شدند.

- 1- Liquid Chromatography-Mass/Mass
- 2- High Performance Liquid Chromatography
- 3- Formic acid
- 4- Fragmentation voltage
- 5- Precursor ion
- 6- Daughter ion
- 7- Product ion

8- Linear Dynamic Ranges (LDR)

9- Limit of Quantitation (LOQ)

10- Relative Standard Deviation (RSD)

داگونیس® در مجموع از روز دوم پس از سم‌پاشی، میزان باقی‌مانده در حد مجاز را دارا می‌باشد (جدول ۴).

جدول ۲- شرایط بهینه برای به‌دست آوردن حداکثر حساسیت نسبت به قارچ‌کش‌های مورد مطالعه

Table 2- Optimum conditions to obtain maximum sensitivity to the studied fungicides

Compound	Retention time (min)	Parent ion (m.z ⁻¹)	Product ion (m.z ⁻¹)	Collision energy
Fluxapyroxad	7.5	383 (42)	314 (20)	342 (20)
Difenoconazole	8.3	407 (100)	337 (15)	251 (10)
Tetraconazole	7.5	373 (110)	70 (20)	159 (20)
Azoxystrobin	7.4	405 (144)	372 (20)	344 (20)
Boscalid	7.6	344 (95)	140 (20)	307 (20)
Pyraclostrobin	8.9	389 (155)	133 (20)	163 (20)

جدول ۳- ارزیابی عملکرد روش‌های استخراج و آنالیز از نظر محدوده دینامیکی خطی و حد کمی

Table 3- Performance evaluation of extraction and analysis methods in terms of linear dynamic range, LOQ (mg kg⁻¹) in LC-MS/MS

Compound	Calibration curve equation	LOQ	LDR	% Matrix effect
Fluxapyroxad	y = 52059x + 32533	0.05	0.05-1	-20
Difenoconazole	y = 57342x + 14017	0.01	0.01-1	-21
Tetraconazole	y = 17005x + 47809	0.01	0.01-1	-24
Azoxystrobin	y = 62834x + 74864	0.01	0.01-1	-25
Boscalid	y = 77571x + 74113	0.05	0.05-1	-17
Pyraclostrobin	y = 62682x + 3281.8	0.05	0.05-1	-18

سم‌پاشی برداشت شود (جدول ۵). نمونه‌های تیمار سیگنوم® که شامل دو جزء قارچ‌کش بوسکالید و پیراکلواستروبین است هم، پس از اندازه‌گیری باقی‌مانده آن‌ها مشخص شد که میانگین باقی‌مانده پیراکلواستروبین یک روز پس از محلول‌پاشی معادل ۱/۸ میلی‌گرم بر کیلوگرم (بیش از حد مجاز می‌باشد) و دو روز پس از سم‌پاشی این مقدار به پایین‌تر از بیشینه مجاز این قارچ‌کش (یک میلی‌گرم بر کیلوگرم) رسید، هرچند که میانگین باقی‌مانده بوسکالید از همان روز اول پس از سم‌پاشی پایین‌تر از بیشینه مجاز این قارچ‌کش (سه میلی‌گرم بر کیلوگرم) بود. بنابراین، از روز دوم سم‌پاشی محصول قابل برداشت و مصرف می‌باشد (جدول ۶). در نمونه‌های شاهد باقی‌مانده قارچ‌کش‌های تحت آزمایش یافت نگردید.

در نمونه‌های گوجه‌فرنگی جمع‌آوری شده مربوط به تیمار آفانوس® نیز باقی‌مانده دو قارچ‌کش تتراکونازول و آزوکسی‌استروبین که اجزای تشکیل‌دهنده آن هستند اندازه‌گیری شدند. میانگین باقی‌مانده تتراکونازول در روزهای اول و دوم بعد از محلول‌پاشی به‌ترتیب ۰/۱۶ و ۰/۱۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم بود که در روز سوم این مقدار برابر با بیشینه مجاز این قارچ‌کش (۰/۱ میلی‌گرم بر کیلوگرم) رسید و سپس سیر کاهشی را تا روز پنجم نشان داد. قارچ‌کش آزوکسی‌استروبین از روز اول پس از سم‌پاشی میزانی پایین‌تر از بیشینه مجاز آن (سه میلی‌گرم بر کیلوگرم) را دارا بود که این میزان قابل قبول می‌باشد. بنابراین، با توجه به رسیدن میزان باقی‌مانده تتراکونازول در روز سوم پس از سم‌پاشی به بیشینه مجاز آن در گوجه‌فرنگی، پیشنهاد می‌گردد که این محصول سه روز بعد از

جدول ۴- باقی‌مانده قارچ‌کش داگونیس (فلوکسایپروکساد + دیفنوکونازول) در گوجه‌فرنگی در روزهای یک تا پنج پس از محلول‌پاشی

Table 4- Residue levels of Dagonis (fluxapyroxad + difenoconazole) in tomato on days 1 to 5 after spraying

Samples	Dagonis® (1200 mL ha ⁻¹)									
	Fluxapyroxad (Codex MRL= 0.2 mg kg ⁻¹)					Difenoconazole (National MRL= 0.6 mg kg ⁻¹)				
	Concentrations (mg kg ⁻¹)	Mean	SD±			Concentrations (mg kg ⁻¹)	Mean	SD±		
Day 1	1.0 1.25 1.44 1.23 0.18					0.04 0.03 0.05 0.04 0.008				
Day 2	<LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ					<LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ				
Day 3	<LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ					<LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ				
Day 4	<LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ					<LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ				
Day 5	ND ND ND ND ND					ND ND ND ND ND				
Control	ND ND ND ND ND					ND ND ND ND ND				

Limit of Quantitation (LOQ), Not Detected (ND).

جدول ۵- باقی‌مانده قارچ‌کش آفیانس (تتراکونازول + آزوکسی‌استروبین) در گوجه‌فرنگی در روزهای یک تا پنج پس از محلول‌پاشی

Table 5- Residue levels of Affiance (tetraconazole + azoxystrobin) in tomatoes on days 1 to 5 after spraying

Samples	Affiance® (600 mL ha ⁻¹)					
	Tetraconazole (EU MRL= 0.1 mg kg ⁻¹)			Azoxystrobin (National MRL= 3 mg kg ⁻¹)		
	Concentrations (mg kg ⁻¹)	Mean	SD±	Concentrations (mg kg ⁻¹)	Mean	SD±
Day 1	0.14 0.18 0.16	0.16	0.016	1.55 1.36 1.78	1.56	0.17
Day 2	0.14 0.15 0.16	0.15	0.008	1.05 1.1 1.22	1.12	0.071
Day 3	0.08 0.09 0.13	0.1	0.021	1.01 0.9 1.21	1.04	0.128
Day 4	0.04 0.06 0.08	0.06	0.016	0.85 0.5 1.13	0.82	0.26
Day 5	0.04 0.02 0.06	0.04	0.016	0.07 0.08 0.088	0.08	0.007
Control	ND ND ND	ND	ND	ND ND ND	ND	ND

European Union Maximum Residue Limits (EU), no national MRL

جدول ۶- باقی‌مانده قارچ‌کش سیگنوم (بوسکالید + پیراکلوستروبین) در گوجه‌فرنگی در روزهای یک تا پنج پس از محلول‌پاشی

Table 6- Residue levels of Signum (boscalid + pyraclostrobin) in tomatoes on days 1 to 5 after spraying

Samples	Signum® (500 gm ha ⁻¹)					
	Boscalid (EU MRL= 3 mg kg ⁻¹)			Pyraclostrobin (National MRL= 1 mg kg ⁻¹)		
	Concentrations (mg kg ⁻¹)	Mean	SD±	Concentrations (mg kg ⁻¹)	Mean	SD±
Day 1	1.02 0.75 1.03	0.93	0.129	2.1 1.6 1.7	1.8	0.216
Day 2	0.95 0.75 0.65	0.78	0.124	0.42 0.28 0.35	0.35	0.057
Day 3	0.8 0.75 0.6	0.7	0.084	0.3 0.28 0.33	0.30	0.02
Day 4	0.5 0.7 0.6	0.6	0.081	ND ND ND	ND	ND
Day 5	0.4 0.68 0.53	0.54	0.11	ND ND ND	ND	ND
Control	ND ND ND	ND	ND	ND ND ND	ND	ND

European Union Maximum Residue Limits (EU), no national MRL, Not Detected (ND).

بحث

داگونیس^{*}، آفیانس^{*} و سیگنوم^{*} به‌ترتیب با دوزهای ۶۰۰ و ۱۲۰۰ میلی‌لیتر و ۵۰۰ گرم در هکتار بیشترین تأثیر را در مهار شدت بیماری داشتند.

آنچه مسلم است اینکه مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌های گیاهی در کشاورزی پایدار، نقش اساسی در پیشگیری و مهار این عوامل دارد. به تبع کاربرد ترکیبی قارچ‌کش‌ها به‌خصوص قارچ‌کش‌های با پایه مواد معدنی در کاهش و مهار بیماری مؤثر خواهد بود. در ضمن با توجه به تغییرات آب‌وهوایی در سال‌های اخیر که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم روی میزان حساسیت رقم، میزان آلودگی به بیماری، شدت بیماری‌زایی عامل بیماری و میزان کارایی قارچ‌کش‌های رایج مورد استفاده داشته است، انجام آزمایش‌هایی با قارچ‌کش‌های جدید، برای در اختیار داشتن دامنه گسترده‌تری از قارچ‌کش‌های با تأثیر مورد قبول برای این بیماری لازم به نظر می‌رسد (Shojaei et al., 2013).

قارچ‌کش داونیس^{*} متشکل از دو جزء قارچ‌کش فلوکسپایروکساد و دینوکونازول در نمونه‌های میوه گوجه‌فرنگی جمع‌آوری شده در روزهای اول تا پنجم پس از سم‌پاشی اندازه‌گیری شدند. با توجه به بیشینه مجاز قارچ‌کش فلوکسپایروکساد که معادل ۰/۲ میلی‌گرم بر کیلوگرم می‌باشد، نمونه یک روز پس از سم‌پاشی بیش از حد مجاز باقی‌مانده داشت، اگر چه از روز دوم به بعد میزان باقی‌مانده این

هر چند که مدیریت بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی متکی به روش‌های پیش‌گیری در کاهش بیماری مؤثر است، ولی بدون استفاده به‌هنگام از برنامه‌های زمان‌بندی شده سم‌پاشی با قارچ‌کش‌های مؤثر، امکان مهار کامل این بیماری وجود ندارد. استفاده از قارچ‌کش‌هایی مانند آزوکسی‌استروبین، پیراکسی‌استروبین، ترکیبات مسی و بیکرینات پتاسیم هر ۷-۱۰ روز برای مهار بیماری لکه‌موجی توصیه شده است (Dillard et al., 1995). اولسون و همکاران (Olson et al., 2012) در سال ۲۰۱۲ و ملازینی (Mazzini, 2009) در سال ۲۰۰۹ قارچ‌کش کانستو^{*} را در مهار بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی در شرایط مزرعه و گلخانه مؤثر دانسته و آن را توصیه نمودند.

برای مهار بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی اغلب از سموم شیمیایی مختلف استفاده می‌شود، و با توجه به شرایط محیطی کشت این محصول در گلخانه‌ها، ممکن است به‌دلیل وجود رطوبت بالا و دمای معتدل، وقوع بیماری و گسترش آلودگی به دفعات تکرار شود و از این رو نیاز به انجام سم‌پاشی‌های مکرر می‌باشد. شریفی و همکاران (Sharifi et al., 2024) تأثیر دوزهای مختلف قارچ‌کش‌های داونیس^{*}، آفیانس^{*} و سیگنوم^{*} را در مهار بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی مورد ارزیابی قرار دادند. بر این اساس، قارچ‌کش‌های

دیگر توسط محققان لهستانی که روی دوره کارنس شش قارچ‌کش استفاده شده روی گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای انجام گرفت، دوره کارنس قارچ‌کش سیگنوم سه روز برآورد گردید (Jankowska et al., 2016). در مطالعات فعلی می‌توان نتیجه گرفت که دوره کارنس دو روزه نیز برای این قارچ‌کش قابل قبول می‌باشد.

در تحقیقاتی که توسط هپساگ و کیزیلدنیز در ترکیه روی گوجه‌فرنگی انجام شد، ۱۴۵ آفت‌کش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان داد که ۶۱/۵ درصد از نمونه‌ها دارای باقی‌مانده یک یا چند آفت‌کش هستند که ۱۲/۲ درصد آن‌ها بالاتر از بیشینه مانده مجاز اتحادیه اروپا می‌باشد. بیشترین آفت‌کش‌های شناسایی شده کلروپیرفوس متیل، سیفلوترین، دلتامترین و استامی‌پرید بودند و کلیه قارچ‌کش‌های شناسایی شده در حد مجاز بودند از جمله تتراکونازول، آزوکسی‌استروبی، بوسکالید و دیفنوکونازول (Hepsag & Kizildeniz, 2021). همچنین در مطالعاتی که توسط سلامزاده و همکاران (Salamzadeh et al., 2018) در ایران صورت گرفته است، ۸۵ نوع آفت‌کش در نمونه‌های گوجه‌فرنگی بررسی شدند که صرفاً چهار آفت‌کش کلروپیرفوس، دیازینون، اپرودیون و پرمترین در نمونه‌ها مشاهده شد که فقط دو آفت‌کش اول دارای باقی‌مانده بیش از حد مجاز بود. از ۲۳ نمونه گوجه‌فرنگی و ۵۷ نمونه کاهو جمع‌آوری شده از منطقه شهری وابسته به پایتخت شیلی، بیش از ۵۰ درصد نمونه‌ها دارای مانده یک یا چند آفت‌کش بودند که ۱۶ درصد آن‌ها بیش از حد مجاز کشور شیلی بودند. در این مطالعات، بیشترین آفت‌کش‌های مشاهده شده شامل متامیدوفوس، متومیل، دیفنوکونازول، سیپرودینیل و بوسکالید بودند (Elgueta et al., 2020). در تحقیقاتی که در عربستان سعودی روی ۲۲ نمونه گوجه‌فرنگی انجام گرفت، باقی‌مانده ۴۱۲ آفت‌کش بررسی گردید (شامل قارچ‌کش‌های مطالعات فعلی نیز بودند) که ۳۶ درصد از این نمونه‌ها دارای باقی‌مانده هشت آفت‌کش بودند که تمامی آن‌ها پایین‌تر از حد مجاز بودند. در میان آفت‌کش‌های بررسی شده سایپرمتترین و کاربندازیم بیشتر از دیگر آفت‌کش‌ها مشاهده گردید (Abd-Elhaleem, 2020). در کلمبیا نیز مطالعاتی روی گوجه‌فرنگی برای پایش ۲۴ آفت‌کش انجام گرفت که صرفاً یک نمونه دارای باقی‌مانده قارچ‌کش کاربندازیم بود که مقدار آن بیش از حد مجاز بود و حداقل یک آفت‌کش در ۷۰/۵ درصد نمونه‌ها مشاهده گردید که همگی پایین‌تر از حد مجاز بودند. این آفت‌کش‌ها شامل پیریمتانیل، کاربندازیم، دیمتومورف و اسفیت بودند و نتایج این بررسی نشانگر عدم وجود خطر برای مصرف‌کنندگان این محصول است (Arias et al., 2014). اگرچه احمد و همکاران (Ahmed et al., 2016) در مصر با بررسی ۱۶ نمونه گوجه‌فرنگی که از هشت میدان میوه و تره‌بار در پنج شهر جمع‌آوری شده بود، تعداد ۳۸ آفت‌کش را بررسی کردند که در ۱۳ نمونه آن، باقی‌مانده آفت‌کش وجود داشت که در هفت نمونه این مقدار بیش از حد مجاز بود.

قارچ‌کش پایین‌تر از حد کمی دستگاه بوده و عملاً کمتر از بیشینه مجاز باقی‌مانده این قارچ‌کش می‌باشد. این در حالی است که قارچ‌کش دیفنوکونازول که دارای بیشینه مجاز ۰/۶ میلی‌گرم بر کیلوگرم است، از یک روز بعد از سم‌پاشی با میزان اندازه‌گیری شده ۰/۰۴ میلی‌گرم بر کیلوگرم در نمونه‌ها یافت شده که کمتر از بیشینه مجاز بود. بنابراین داگونیس در مجموع از روز دوم پس از سم‌پاشی، میزان باقی‌مانده در حد مجاز را دارا می‌باشد. در مطالعاتی که توسط مرکز ثبت آفت‌کش‌ها در آلمان روی قارچ‌کش داگونیس^۱ صورت گرفته است، دوره کارنس این قارچ‌کش روی گوجه‌فرنگی سه روز تعیین گشته است (Anonymous, 2019)، حال آنکه در مطالعات فعلی از روز دوم بعد از محلول‌پاشی، میانگین میزان باقی‌مانده داگونیس به حد مجاز رسیده است.

در نمونه‌های میوه گوجه‌فرنگی جمع‌آوری شده مربوط به تیمار آفیانس^۲ هم باقی‌مانده دو جزء قارچ‌کش تتراکونازول و آزوکسی‌استروبین اندازه‌گیری شد. میزان باقی‌مانده تتراکونازول پس از گذشت سه روز از سم‌پاشی به‌مقدار برابر با بیشینه مجاز این قارچ‌کش (۰/۱ میلی‌گرم بر کیلوگرم) رسید و سپس سیر کاهشی را تا روز پنجم نشان داد. قارچ‌کش آزوکسی‌استروبین از روز اول پس از سم‌پاشی، میزانی پایین‌تر از بیشینه مجاز آن (سه میلی‌گرم بر کیلوگرم) را دارا بود که این میزان قابل قبول می‌باشد. بنابراین با توجه به رسیدن میزان باقی‌مانده تتراکونازول در روز سوم پس از سم‌پاشی به حد بیشینه مجاز آن در گوجه‌فرنگی قابل پیشنهاد است. در مطالعاتی که توسط آژانس حفاظت محیط‌زیست آمریکا برای تعیین دوره کارنس آفیانس در محصولات مختلف انجام شده است، دوره کارنس این قارچ‌کش روی گوجه‌فرنگی یک روز اعلام شده است (USEPA, 2023). در مطالعات دیگر توسط مرجع سلامت غذا اتحادیه اروپا^۱ (EFSA)، دوره کارنس تتراکونازول که جزئی از قارچ‌کش آفیانس می‌باشد، در گوجه‌فرنگی سه روز ذکر شده است (EFSA, 2021) که نتایج آن با تحقیقات فعلی همسو می‌باشد.

باقی‌مانده اجزاء قارچ‌کش سیگنوم^۳ که شامل بوسکالید و پیراکلواستروبین می‌باشد هم پس از اندازه‌گیری باقی‌مانده آن‌ها نشان داد که باقی‌مانده پیراکلواستروبین دو روز پس از سم‌پاشی، پایین‌تر از بیشینه مجاز این قارچ‌کش (یک میلی‌گرم بر کیلوگرم) می‌باشد، هرچند که باقی‌مانده بوسکالید یک روز پس از سم‌پاشی، پایین‌تر از بیشینه مجاز این قارچ‌کش (سه میلی‌گرم بر کیلوگرم) بود. بنابراین، از روز دوم سم‌پاشی به بعد، محصول قابل برداشت و مصرف می‌باشد. در مطالعاتی که توسط کمیسیون ملی ارزیابی فرانسه جهت بررسی دوره کارنس این قارچ‌کش انجام گرفت، نتایج حاکی از دوره کارنس سه روزه می‌باشد (National Assessment France, 2020). در بررسی

آفت‌کش‌های یافت شده در این نمونه‌ها شامل هپتاکلر-اپوکساید، دی دی ای، پروفنفسوس، گاما-اچ سی اچ و پیریمیفوس متیل بودند و باقی‌مانده سایر آفت‌کش‌ها مانند پرمترین، فنولریت، دلتامترین، فن‌پروپاتریت، تراکونازول و دیفتوکونازول در حد مجاز بودند.

نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج به‌دست آمده، قارچ‌کش‌های آفیانس[®] با مقادیر ۶۰۰ میلی‌لیتر در هکتار با در نظر گرفتن کارایی مناسب، داگونیس[®] با دوز ۱۲۰۰ میلی‌لیتر در هکتار و سیگنوم[®] به مقدار ۵۰۰ گرم در هکتار از کارایی مناسبی در مهار بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی برخوردار

هستند و میزان باقی‌مانده آن‌ها در زمان برداشت در حد مجاز می‌باشد، لذا با توجه به دوره کارنس تعیین شده، قابل توصیه در مدیریت این بیماری هستند.

سیاسگزاری

این پژوهش، قسمتی از طرح ثبت قارچ‌کش آفیانس به شماره مصوب ۱۳۹-۹۹۱۳۱۴-۱۶-۱۶-۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ در مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور می‌باشد. هزینه آزمایشات توسط شرکت بازرگان کالا پرداخت گردیده است.

References

1. Abd-Elhaleem, Z.A. (2020). Pesticide residues in tomato and tomato products marketed in Majmaah province, KSA, and their impact on human health. *Environmental Science and Pollution Research*, Online Publication: 06 January 2020. 9 pp. <https://doi.org/10.1007/s11356-019-07573-x>
2. Ahmadijeh, M., & Doodabi, A. (1986). Early blight disease caused by *Alternaria solani* fungus. *Proceedings of the 9th Plant Protection Congress of Iran*, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Iran. pp. 62. https://conference.areeo.ac.ir/article_11102.html. (In Persian).
3. Ahmed, M.A.I., Add El Rahman, T.A., & Khalid, N.S. (2016). Dietary intake of potential pesticide residues in tomato samples marketed in Egypt. *Research Journal of Environmental Toxicology*. 10: 213-219. <https://doi.org/10.3923/rjet.2016.213.219>
4. Anonymous, (2022). Agricultural statistics. Ministry of Agriculture Jihad, Iran. pp. 123. (In Persian).
5. Anonymous, (2022). FRAC Code List[®] (2022). www.frac.info/publications
6. Anonymous, (2019). Registration Report of Dagonis-Part A, National assessment, Federal Republic of Germany.
7. Arias, L.A., Bojaca, C.R., Ahumada, D.A., & Schrevens E. (2014). Monitoring of pesticide in tomato marketed in Bogota, Colombia. *Food Control*, 35(1), 213-217. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2013.06.046>
8. Bai, Y., & Lindhout, P. (2007). Domestication and breeding of tomatoes: What have we gained and what can we gain in the future? *Annals of Botany*, 100(5), 1085-1094. <https://doi.org/10.1093/aob/mcm150>
9. Baimani, M., Hayati, J., & Shetab Bushehri, M. (2002). Determination of the dominant species of causal agent of Early blight disease of tomato and investigation on the best culture medium for the growth of the pathogen. *Proceedings of the 15th Plant Protection Congress of Iran*. University of Razi, Kermanshah. Karaj, Iran. pp. 176. (In Persian)
10. British Standard (2008). Foods of plant origin — Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE— QuEChERS-method. BS EN 15662 (E). 81 pp.
11. Chaerani, R., Remmelt, G., Stem, P., Roseland, E., & Voorrips, R.E. (2007). Assessment of early blight (*Alternaria solani*) resistance in tomato using a droplet inoculation method. *Journal of General Plant Pathology*, 73(2): 96-103. <https://doi.org/10.1007/s10327-006-0337-1>
12. Dillard, H., Cole, D., Hedges, T., Turner, A., Utete, D., Mvere, B., Agubba, M., & Wilkinson, P. (1995). Early Blight of Tomatoes. *Zimbabwe Horticultural Crops Pest Management*. NYSAES, Geneva NY. 2 pp.
13. EFSA, (2021). Review of the existing maximum residue levels for tetraconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA journal, 21 Dec. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7111>.
14. Elgueta, S., Valenzuela, M., Fuentes, M., Meza, P., Manzur, J.P., Liu, S., Zhao, G., & Correa, A. (2020). Pesticide residues and health risk assessment in tomatoes and lettuces from farms of Metropolitan region Chile. *Molecules*, 25, 355. <https://doi.org/10.3390/molecules25020355>
15. EL-Tanany, M.M., Hafez, M.A., Ahmed, G.A., & Abd El-Mageed, M.H. (2018). Efficiency of biotic and abiotic inducers for controlling tomato early blight disease. *Middle East Journal of Agricultural Research*, 7(2), 650-670.
16. Ershad, J. (1998). *Fungi of Iran*. Publications of the Iranian Research Institute of Plant Protection. 874 pp. https://press-iripp.areeo.ac.ir/book_1747.html. (In Persian).

17. Eslami, Z., Mahdavi, V., & Tajdar-Oranj, B. (2021). Probabilistic health risk assessment based on Monte Carlo simulation for pesticide residues in date fruits of Iran. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(31), 42037-42050. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-13542-0>
18. European Food Safety Authority (2021). Review of the existing maximum residue levels for tetraconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No. 396/2005. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7111>
19. Fishel, F.M., & Dewdney, M.M. (2012). Fungicide Resistance Action Committee's (FRAC) Classification Scheme of Fungicides According to Mode of Action. Pesticide Information Office, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. 7 pp. <http://edis.ifas.ufl.edu>
20. Foolad, M.R., Ntahimpera, N., Christ, B.J., & Lin, G.Y. (2000) Comparison of field, greenhouse, and detached-leaflet evaluations of tomato germ plasm for early blight resistance. *Plant Disease*, 84(9), 967-972. <https://doi.org/10.1094/PDIS.2000.84.9.967>
21. Gentili, E., Tarlazzi, S., Balzaretto, G., Romagnoli, C., Marchi, A., Manaresi, M., & Coatti, M. (2006). Boscalid plus pyraclostrobin based formulations for the control of fungal diseases on pome and stone fruits, strawberries and vegetables [Piedmont; Emilia-Romagna; Veneto]. *Atti delle Giornate Fitopatologiche*, 2, 35-40.
22. Hansen. M.A. (2009). Early Blight of Tomatoes. Plant Disease Fact Sheets. Virginia cooperative extension. Produced by Communications and Marketing, College of Agriculture and Life Sciences, Virginia Polytechnic Institute and State University. WWW.ext.vt.edu.
23. Hepsag, F., & Kizildeniz, T. (2021). Pesticide residues and health risk appraisal of tomato cultivated in greenhouse from the Mediterranean region of Turkey. *Environmental Sciences and Pollution Research*, 28, 22551-22562. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-12232-7>
24. Jaliani, N. (1991). Tomato Early blight disease and its chemical control in Jiroft and Kahnuj region. *Proceedings of 10th Plant Protection Congress of Iran*. Faculty of Agriculture, University of Kerman, Iran. 118. https://conference.areeo.ac.ir/article_2009.html. (In Persian).
25. Jankowska, M., Kaczynski, P., Hrynko, I., & Lozowicka, B. (2016). Dissipation of six fungicides in greenhouse-grown tomatoes with processing and health risk. *Environmental Science and Pollution Research*, 23, 11885-11900. <https://doi.org/10.1007/s11356-016-6260-x>
26. Macar, O., Kalefetoğlu Macar, T., Yalçın, E., & Çavuşoğlu, K. (2022). Acute multiple toxic effects of Trifloxystrobin fungicide on *Allium cepa* L. *Scientific Reports*, 12(1), 1-9. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-19571-0>
27. Mahdavi, V., Eslami, Z., Gordan, H., Ramezani, S., Peivasteh-Roudsari, L., Ma'mani, L., & Mousavi Khaneghah, A., (2022). Pesticide residues in green-house cucumber, cantaloupe, and melon samples from Iran: A risk assessment by Monte Carlo Simulation. *Environmental Research*, 206. 44 pp. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.112563>
28. Mahdavi, V., Heris, M.E.S., Dastranj, M., Eslami, Z., & Aboul-Enein, H.Y. (2021). Assessment of pesticide residues in soils using a QuEChERS extraction procedure and LC-MS/MS. *Water, Air, and Soil Pollution*, 232(4), 159. <https://doi.org/10.1007/s11270-021-05104-4>
29. Mazzini, F. (2009). Consento Duo: A new fungicide mixture for horticulture against *Peronospora* and *Alternaria*. *Informatore Agrario Supplemento*, 65(26), 14-15. <https://www.sid.ir/paper/1053065/en>
30. National Assessment France (2020). Signum Risk Management. Registration Report, Part A, BAS 51607F. France.
31. Olson, M. & Santos, B.M. (2012). Vegetable Production Handbook for Florida. 344 pp. <https://www.slideshare.net/slideshow/2012-vpg/14890643>.
32. Rosenzweig, N., Hanson, L.E., Mambetova, S., Jiang, Q.W., Guza, C., Stewart, J., & Somohano, P. (2019). Fungicide sensitivity monitoring of *Alternaria* spp. causing leaf spot of sugar beet (*Beta vulgaris*) in the Upper Great Lakes. *Plant Disease*, 103(9), 2263-2270. <https://doi.org/10.1094/PDIS-12-18-2282-RE>
33. Salamzadeh, J., Shakoori, A., & Moradi, V. (2018). Occurrence of multiclass pesticide residues in tomato samples collected from different markets of Iran. *Journal of Environmental Health and Science and Engineering*, 16(3): 1-9. <https://doi.org/10.1007/s40201-018-0296-4>
34. Saleem, A., & El-Shahir, A.A. (2022) Morphological and molecular characterization of some *Alternaria* species isolated from tomato fruits concerning mycotoxin production and polyketide synthase genes. *Plants*, 11(9), 1168. <https://doi.org/10.3390/plants11091168>
35. Sharifi, K., Goudarzi, A., & Safaie Farahani, B. (2024). Efficacy of several new fungicides in control of tomato early blight disease. *Journal of Applied Research in Plant Protection*, 13(1), 59-71. magiran.com/p2720002. (In Persian)
36. Shojaei, B., Tekkieh, L.E., & Rasouli, A.S. (2013). The necessity of integrated pest management in agriculture and its role in agricultural sustainability. *First National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture, Hamedan Province Hamedan*, Iran. pp. 1-19. (In Persian)

37. Stammer, G., Bohme, F., Philippi, J., Miessner, S., & Tegge, V. (2014) Pathogenicity of *Alternaria* species on potatoes and tomatoes. In Fourteenth Euro Blight Workshop PPO Special Report, 16, 85–96.
https://www.researchgate.net/profile/Gerd-Stammer/publication/274379185_Pathogenicity_of_Alternaria-species_on_potatoes_and_tomatoes/links/551d2e7b0cf2000f8f9386c5/Pathogenicity-of-Alternaria-species-on-potatoes-and-tomatoes.pdf.
38. Strathmann, S., Walker, S. and Barnes, J., (2011) June. Fluxapyroxad: A new broad-spectrum fungicide. In *Phytopathology* (Vol. 101, No. 6, pp. S172-S172). 3340 PILOT KNOB ROAD, ST PAUL, MN 55121 USA: AMER PHYTOPATHOLOGICAL SOC.